П N014462/01 от 30.10.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Клексан®

торговое наименование лекарственного препарата

раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл; 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл; 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл; 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл; 10000 анти-Ха МЕ/1 мл

лекарственная форма, дозировка

Санофи Винтроп Индустрия, Франция

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия

АО «Санофи Восток», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Формы выпуска Раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/ 0,2 мл; 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл; 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл; 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл; 10000 анти-Ха МЕ/1 мл. В случае производства на Санофи Винтроп Индустрия, Франция *1 вид упаковки*	**Формы выпуска** Раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/ 0,2 мл; 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл; 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл; 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл; 10000 анти-Ха МЕ/1 мл. В случае производства на Санофи Винтроп Индустрия (Ле-Тре или Мезон-Альфор), Франция или ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических продуктов ЗАО, Венгрия *1 вид упаковки*

152241

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл, или 1,0 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) соответственно. По 2 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. *2 вид упаковки* По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл, или 1,0 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) с защитной системой иглы соответственно. По 2 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. <u>В случае производства на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия</u> *1 вид упаковки* По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) соответственно. По 2 или 3 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров (2 шприца в блистере) или по 3 блистера (3 шприца в блистере) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. *2 вид упаковки* По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) с защитной системой иглы соответственно. По 2 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл, или 1,0 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) соответственно. По 2 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. *2 вид упаковки* По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл, или 1,0 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) с защитной системой иглы соответственно. По 2 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. <u>В случае производства на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия</u> *1 вид упаковки* По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) соответственно. По 2 или 3 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров (2 шприца в блистере) или по 3 блистера (3 шприца в блистере) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. *2 вид упаковки* По 0,2 мл или 0,4 мл, или 0,6 мл, или 0,8 мл раствора препарата в стеклянный шприц (тип I) с защитной системой иглы соответственно. По 2 шприца в блистер. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
	В случае упаковки на АО «Санофи Восток», Россия или на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» Россия. По 1 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку из картона. Транспортная тара в соответствии с ГОСТ 17768-90.
Производитель *Производство готовой лекарственной формы и фасовщик (первичная упаковка)* 1. Санофи Винтроп Индустрия, Франция 1051 бульвар Индустриель, 76580 Ле-Тре, Франция 2. Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28. (для 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл; 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл; 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл; 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл). *Упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка) и выпускающий контроль качества* 1. Санофи Винтроп Индустрия, Франция 1051 бульвар Индустриель, 76580 Ле-Тре, Франция 2. Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28.	**Производитель** *Производство готовой лекарственной формы и фасовщик (первичная упаковка)* 1. Санофи Винтроп Индустрия, Франция. 1051 бульвар Индустриель, 76580 Ле-Тре, Франция. 2. Санофи Винтроп Индустрия, Франция. 180 рю Жан Жар, Мезон-Альфор, 94700, Франция. 3. Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия. Россия, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28. (для 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл; 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл; 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл; 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл). 4. ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических продуктов ЗАО, Венгрия. 3510 Мишкольц, Чаниквёльд, Венгрия.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
3. АО «Санофи Восток», 302516, Россия, Орловская область, Орловский район, с/п Большекуликовское, ул. Ливенская, д. 1.	*Упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка) и выпускающий контроль качества* 1. Санофи Винтроп Индустрия, Франция. 1051 бульвар Индустриель, 76580 Ле-Тре, Франция. 2. Санофи Винтроп Индустрия, Франция. 180 рю Жан Жар, Мезон-Альфор, 94700, Франция. 3. Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия. Россия, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28. 4. ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических продуктов ЗАО, Венгрия. 3510 Мишкольц, Чаниквёльд, Венгрия. 5. АО «Санофи Восток», Россия. Россия, 302516 Орловская область, м.о. Орловский, ул. Ливенская, д. 1.
Претензии потребителей направлять по адресу АО «Санофи Россия». 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22. Тел.: +7 (495) 721-14-00. Факс: +7 (495) 721-14-11.	**Претензии потребителей направлять по адресу:** АО «Санофи Россия», Россия. 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22. Тел.: +7 (495) 721-14-00.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
Инструкция по самостоятельному выполнению инъекции препарата **Клексан®** *(предварительно заполненный шприц без защитной системы иглы)*	**Инструкция по самостоятельному выполнению инъекции препарата Клексан®** *(предварительно заполненный шприц без защитной системы иглы)*
Подготовка места инъекции 1) Выберите область на правой или левой половине передней брюшной стенки. Она должна находиться на расстоянии не менее 5 см от пупка и с боковой стороны. • Не проводите инъекцию ближе 5 см от пупка или вокруг имеющихся шрамов или кровоподтеков. • Чередуйте места инъекции между левой и правой сторонами живота, в зависимости от области, в которую Вы вводили препарат в последний раз. 	**Подготовка места инъекции** 1) Выберите область на правой или левой половине передней брюшной стенки. Она должна находиться на расстоянии не менее 5 см от пупка и с боковой стороны. • Не проводите инъекцию ближе 5 см от пупка или вокруг имеющихся шрамов или кровоподтеков. • Чередуйте места инъекции между левой и правой сторонами живота, в зависимости от области, в которую Вы вводили препарат в последний раз. 
2) Вымойте руки. Очистите (но не трите) место инъекции спиртовым тампоном или водой с мылом.	2) Вымойте руки. Очистите (но не трите) место инъекции спиртовым тампоном или водой с мылом.
3) Примите удобное положение «сидя» или «лежа» и расслабьтесь. Убедитесь, что Вам видно место, выбранное для инъекции. Для	3) Примите удобное положение «сидя» или «лежа» и расслабьтесь. Убедитесь, что Вам видно место, выбранное для инъекции. Для



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
проведения инъекции идеально подходят шезлонг, кресло для отдыха или кровать. **Выбор необходимой дозы** 1) Осторожно снимите колпачок с иглы шприца. Выбросьте колпачок. • Не нажимайте на поршень до начала инъекции для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в шприце. Это может привести к потере лекарственного препарата. • После снятия колпачка не допускайте прикосновения иглы к каким-либо предметам. Это необходимо для сохранения чистоты (стерильности) иглы.  2) Если количество лекарственного препарата в шприце уже соответствует предписанной Вам дозе, нет необходимости в ее корректировке. Теперь Вы готовы к введению препарата. 3) Если доза определяется из расчета на массу тела, Вам может потребоваться скорректировать дозу, содержащуюся в шприце, чтобы она соответствовала предписанной. В этом случае Вы можете избавиться от лишнего количества лекарственного препарата, удерживая шприц направленным вниз (чтобы в шприце оставался	проведения инъекции идеально подходят шезлонг, кресло для отдыха или кровать. **Выбор необходимой дозы** 1) Осторожно снимите колпачок с иглы шприца. Выбросьте колпачок. • Не нажимайте на поршень до начала инъекции для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в шприце. Это может привести к потере лекарственного препарата. • После снятия колпачка не допускайте прикосновения иглы к каким-либо предметам. Это необходимо для сохранения чистоты (стерильности) иглы.  2) Если количество лекарственного препарата в шприце уже соответствует предписанной Вам дозе, нет необходимости в ее корректировке. Теперь Вы готовы к введению препарата. 3) Если доза определяется из расчета на массу тела, Вам может потребоваться скорректировать дозу, содержащуюся в шприце, чтобы она соответствовала предписанной. В этом случае Вы можете избавиться от лишнего количества лекарствен-



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
пузырек воздуха) и вытесняя лишнее количество раствора в контейнер. 4) На кончике иглы может появиться капля. В этом случае удалите каплю перед инъекцией, постучав по шприцу, направленному иглой вниз. Теперь Вы готовы к введению препарата. **Инъекция** 1) Держите шприц в руке, которой Вы пишете (как карандаш). Указательным и большим пальцами другой руки осторожно зажмите продезинфицированную область живота, образовав кожную складку. • Убедитесь, что Вы удерживаете кожную складку во время инъекции. 2) Держите шприц так, чтобы игла была направлена прямо вниз (вертикально под углом 90 °). Введите иглу на всю ее длину в кожную складку.  3) Нажмите на поршень шприца большим пальцем. Это приведет к поступлению лекарственного препарата в подкожную жировую клетчатку живота. Завершите инъекцию, введя весь объем лекарственного препарата, находящийся	ного препарата, удерживая шприц направленным вниз (чтобы в шприце оставался пузырек воздуха) и вытесняя лишнее количество раствора в контейнер. 4) На кончике иглы может появиться капля. В этом случае удалите каплю перед инъекцией, постучав по шприцу, направленному иглой вниз. Теперь Вы готовы к введению препарата. **Инъекция** 1) Держите шприц в руке, которой Вы пишете (как карандаш). Указательным и большим пальцами другой руки осторожно зажмите продезинфицированную область живота, образовав кожную складку. • Убедитесь, что Вы удерживаете кожную складку во время инъекции. 2) Держите шприц так, чтобы игла была направлена прямо вниз (вертикально под углом 90 °). Введите иглу на всю ее длину в кожную складку.  3) Нажмите на поршень шприца большим пальцем. Это приведет к поступлению лекарственного препарата в подкожную жи-



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
в шприце. 4) Извлеките иглу из места инъекции, потянув шприц прямо вверх. Направьте иглу в сторону от себя и других людей. Теперь Вы можете отпустить кожную складку.  **После завершения инъекции** 1) Во избежание кровоподтеков не трите место инъекции после выполнения этой процедуры. 2) Выбросьте использованный шприц в контейнер для острых предметов. Плотно закройте контейнер крышкой и оставьте его в недоступном для детей месте. После заполнения контейнера утилизируйте его в соответствии с указаниями врача или провизора. Весь неиспользованный лекарственный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.	ровую клетчатку живота. Завершите инъекцию, введя весь объем лекарственного препарата, находящийся в шприце. 4) Извлеките иглу из места инъекции, потянув шприц прямо вверх. Направьте иглу в сторону от себя и других людей. Теперь Вы можете отпустить кожную складку.  **После завершения инъекции** 1) Во избежание кровоподтеков не трите место инъекции после выполнения этой процедуры. 2) Выбросьте использованный шприц в контейнер для острых предметов. Плотно закройте контейнер крышкой и оставьте его в недоступном для детей месте. После заполнения контейнера утилизируйте его в соответствии с указаниями врача или провизора. Весь неиспользованный лекарственный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
Клексан® *(предварительно заполненный шприц с защитной системой иглы)* **Подготовка места инъекции** 1) Выберите область на правой или левой половине передней брюшной стенки. Она должна находиться на расстоянии не менее 5 см от пупка и с боковой стороны. • Не проводите инъекцию ближе 5 см от пупка или вокруг имеющихся шрамов или кровоподтеков. • Чередуйте места инъекции между левой и правой сторонами живота, в зависимости от области, в которую Вы вводили препарат в последний раз.  2) Вымойте руки. Очистите (но не трите) место инъекции спиртовым тампоном или водой с мылом. 3) Примите удобное положение «сидя» или «лежа» и расслабьтесь. Убедитесь, что Вам видно место, выбранное для инъекции. Для проведения инъекции идеально подходят шезлонг, кресло для отдыха или кровать. **Выбор необходимой дозы**	**Инструкция по самостоятельному выполнению инъекции препарата Клексан®** *(предварительно заполненный шприц с защитной системой иглы ЭРИС)* **Подготовка места инъекции** 1) Выберите область на правой или левой половине передней брюшной стенки. Она должна находиться на расстоянии не менее 5 см от пупка и с боковой стороны. • Не проводите инъекцию ближе 5 см от пупка или вокруг имеющихся шрамов или кровоподтеков. • Чередуйте места инъекции между левой и правой сторонами живота, в зависимости от области, в которую Вы вводили препарат в последний раз.  2) Вымойте руки. Очистите (но не трите) место инъекции спиртовым тампоном или водой с мылом. 3) Примите удобное положение «сидя» или «лежа» и расслабьтесь. Убедитесь, что Вам видно место, выбранное для инъекции. Для проведения инъекции идеально подходят



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
1) Осторожно снимите колпачок с иглы шприца. Выбросьте колпачок. • Не нажимайте на поршень до начала инъекции для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в шприце. Это может привести к потере лекарственного препарата. • После снятия колпачка не допускайте прикосновения иглы к каким-либо предметам. Это необходимо для сохранения чистоты (стерильности) иглы. •  2) Если количество лекарственного препарата в шприце уже соответствует предписанной Вам дозе, нет необходимости в ее корректировке. Теперь Вы готовы к введению препарата. 3) Если доза определяется из расчета на массу тела, Вам может потребоваться скорректировать дозу, содержащуюся в шприце, чтобы она соответствовала предписанной. В этом случае Вы можете избавиться от лишнего количества лекарственного препарата, удерживая шприц направленным вниз (чтобы в шприце оставался пузырек воздуха) и вытесняя лишнее количество раствора в контейнер.	шезлонг, кресло для отдыха или кровать. **Выбор необходимой дозы** 1) Осторожно снимите колпачок с иглы шприца. Выбросьте колпачок. • Не нажимайте на поршень до начала инъекции для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в шприце. Это может привести к потере лекарственного препарата. • После снятия колпачка не допускайте прикосновения иглы к каким-либо предметам. Это необходимо для сохранения чистоты (стерильности) иглы.  2) Если количество лекарственного препарата в шприце уже соответствует предписанной Вам дозе, нет необходимости в ее корректировке. Теперь Вы готовы к введению препарата. 3) Если доза определяется из расчета на массу тела, Вам может потребоваться скорректировать дозу, содержащуюся в шприце, чтобы она соответствовала предписанной. В этом случае Вы можете избавиться от лишнего количества лекарствен-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
4) На кончике иглы может появиться капля. В этом случае удалите каплю перед инъекцией, постучав по шприцу, направленному иглой вниз. Теперь Вы готовы к введению препарата. **Инъекция** 1) Держите шприц в руке, которой Вы пишете (как карандаш). Указательным и большим пальцами другой руки осторожно зажмите продезинфицированную область живота, образовав кожную складку. • Убедитесь, что Вы удерживаете кожную складку во время инъекции. 2) Держите шприц так, чтобы игла была направлена прямо вниз (вертикально под углом 90°). Введите иглу на всю ее длину в кожную складку.  3) Нажмите на поршень шприца большим пальцем. Это приведет к поступлению лекарственного препарата в подкожную жировую клетчатку живота. Завершите инъекцию, введя весь объем лекарственного препарата, находящийся в шприце. 4) Извлеките иглу из места инъекции, потянув	ного препарата, удерживая шприц направленным вниз (чтобы в шприце оставался пузырек воздуха) и вытесняя лишнее количество раствора в контейнер. 4) На кончике иглы может появиться капля. В этом случае удалите каплю перед инъекцией, постучав по шприцу, направленному иглой вниз. Теперь Вы готовы к введению препарата. **Инъекция** 1) Держите шприц в руке, которой Вы пишете (как карандаш). Указательным и большим пальцами другой руки осторожно зажмите продезинфицированную область живота, образовав кожную складку. • Убедитесь, что Вы удерживаете кожную складку во время инъекции. 2) Держите шприц так, чтобы игла была направлена прямо вниз (вертикально под углом 90°). Введите иглу на всю ее длину в кожную складку.  3) Нажмите на поршень шприца большим пальцем. Это приведет к поступлению лекарственного препарата в подкожную жи-


СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
шприц прямо вверх. Защитный механизм автоматически закроет иглу. Теперь Вы можете отпустить кожную складку. Система безопасности, обеспечивающая запуск защитного механизма иглы, активируется только после введения всего содержимого шприца путем нажатия поршня на всю длину его хода.  **После завершения инъекции** 1) Во избежание кровоподтеков не трите место инъекции после выполнения этой процедуры. 2) Выбросьте использованный шприц в контейнер для острых предметов. Плотно закройте контейнер крышкой и оставьте его в недоступном для детей месте. После заполнения контейнера утилизируйте его в соответствии с указаниями врача или провизора. Весь неиспользованный лекарственный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями. При применении препарата строго придерживайтесь рекомендаций, представленных в данной инструкции, а также указаний врача или	ровую клетчатку живота. Завершите инъекцию, введя весь объем лекарственного препарата, находящийся в шприце. 4) Извлеките иглу из места инъекции, потянув шприц прямо вверх. Защитный механизм автоматически закроет иглу. Теперь Вы можете отпустить кожную складку. Система безопасности, обеспечивающая запуск защитного механизма иглы, активируется только после введения всего содержимого шприца путем нажатия поршня на всю длину его хода.  **После завершения инъекции** 1) Во избежание кровоподтеков не трите место инъекции после выполнения этой процедуры. 2) Выбросьте использованный шприц в контейнер для острых предметов. Плотно закройте контейнер крышкой и оставьте его в недоступном для детей месте. После заполнения контейнера утилизируйте его в соответствии с указаниями врача или провизора. Весь неиспользованный лекарственный


СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
провизора. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или провизору.	препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями. При применении препарата строго придерживайтесь рекомендаций, представленных в данной инструкции, а также указаний врача или провизора. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или провизору. **Инструкция по самостоятельному выполнению инъекции препарата Клексан®** *(предварительно заполненный шприц с защитной системой иглы ПРЕВЕНТИС)* **Подготовка места инъекции** 1) Выберите область на правой или левой половине передней брюшной стенки. Она должна находиться на расстоянии не менее 5 см от пупка и с боковой стороны. • Не проводите инъекцию ближе 5 см от пупка или вокруг имеющихся шрамов или кровоподтеков. • Чередуйте места инъекции между левой и правой сторонами живота, в зависимости от области, в которую Вы вводили препарат в последний раз.


СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
	 2) Вымойте руки. Очистите (но не трите) место инъекции спиртовым тампоном или водой с мылом. 3) Примите удобное положение «сидя» или «лежа» и расслабьтесь. Убедитесь, что Вам видно место, выбранное для инъекции. Для проведения инъекции идеально подходят шезлонг, кресло для отдыха или кровать. **Выбор необходимой дозы** 1) Осторожно снимите колпачок с иглы шприца. Выбросьте колпачок. • Не нажимайте на поршень до начала инъекции для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в шприце. Это может привести к потере лекарственного препарата. • После снятия колпачка не допускайте прикосновения иглы к каким-либо предметам. Это необходимо для сохранения чистоты (стерильности) иглы.


СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
	 2) Если количество лекарственного препарата в шприце уже соответствует предписанной Вам дозе, нет необходимости в ее корректировке. Теперь Вы готовы к введению препарата. 3) Если доза определяется из расчета на массу тела, Вам может потребоваться скорректировать дозу, содержащуюся в шприце, чтобы она соответствовала предписанной. В этом случае Вы можете избавиться от лишнего количества лекарственного препарата, удерживая шприц направленным вниз (чтобы в шприце оставался пузырек воздуха) и вытесняя лишнее количество раствора в контейнер. 4) На кончике иглы может появиться капля. В этом случае удалите каплю перед инъекцией, постучав по шприцу, направленному иглой вниз. Теперь Вы готовы к введению препарата. **Инъекция** 1) Держите шприц в руке, которой Вы пишете (как карандаш). Указательным и большим пальцами другой руки осторожно зажмите продезинфицированную область

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
	живота, образовав кожную складку. • Убедитесь, что Вы удерживаете кожную складку во время инъекции. 2) Держите шприц так, чтобы игла была направлена прямо вниз (вертикально под углом 90°). Введите иглу на всю ее длину в кожную складку.  3) Нажмите на поршень шприца большим пальцем. Это приведет к поступлению лекарственного препарата в подкожную жировую клетчатку живота. Завершите инъекцию, введя весь объем лекарственного препарата, находящийся в шприце. 4) Извлеките иглу из места инъекции, потянув шприц прямо вверх, удерживая палец на поршне. Направьте иглу в сторону от себя и других людей и сильно нажмите на поршень, чтобы активировать систему безопасности. Защитный механизм автоматически закроет иглу. Вы услышите «щелчок», подтверждающий активацию защитного механизма. Теперь Вы можете отпустить кожную складку.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.10.2023 № 21228
(Входящий МЗ №4229478)

Старая редакция	Новая редакция
	 **После завершения инъекции** 1) Во избежание кровоподтеков не трите место инъекции после выполнения этой процедуры. 2) Выбросьте использованный шприц в контейнер для острых предметов. Плотно закройте контейнер крышкой и оставьте его в недоступном для детей месте. После заполнения контейнера утилизируйте его в соответствии с указаниями врача или провизора. Весь неиспользованный лекарственный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями. При применении препарата строго придерживайтесь рекомендаций, представленных в данной инструкции, а также указаний врача или провизора. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или провизору.

Менеджер по регистрации К.С. Ступина

ФГБУ НЦЭСМП
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

152241