

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Спирт этиловый

наименование лекарственного препарата

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм40 %, 70 %, 90%

лекарственная форма, дозировка

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1Дата внесения Изменения «  » **03 02 15** 20   г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм.</p> <p>По 50, 100 мл во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для стационаров).</p> <p>По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона</p> | <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40 %, 70 %, 90 %.</p> <p>По 25, 50, 100 мл во флаконы стеклянные с винтовой горловиной оранжевого стекла или во флаконы стеклянные с винтовой горловиной оранжевого или бесцветного стекла, укупоренные алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладкой или укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками.</p> <p>По 25, 50, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата для лекарственных средств.</p> <p>Флаконы герметично укупоривают винтовой крышкой системы «нажать и повернуть» с контролем первого вскрытия или колпачком системы контроля первого вскрытия.</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                   | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(для производственных отделов аптек).</p> <p>По 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры (для производственных отделов аптек).</p> <p>По 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров).</p> | <p>По 25, 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена для лекарственных препаратов из полиэтилена высокой плотности низкого давления в комплекте с крышкой с контрольным вскрытием.</p> <p>Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл флаконов с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (для стационаров).</p> <p>По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл флаконов с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (для производственных отделов аптек).</p> <p>На коробку (для стационаров), (для производственных отделов аптек) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющиеся этикетки.</p> <p>По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров).</p> <p>По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры из полиэтилена низкого давления (для производственных отделов аптек).</p> <p>На канистру (для стационаров), (для производственных отделов аптек) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющиеся этикетки.</p> <p>На канистру (для стационаров), (для произ-</p> |

| Старая редакция | Новая редакция                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | водственных отделов аптек) приклеивают инструкцию по применению из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющуюся. |

Генеральный директор  
ПХФК ОАО «Медхимпром»



М.А. Шибает

