

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ

наименование лекарственного препарата

раствор для наружного применения 40%, 70%, 90%

лекарственная форма, дозировка

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » ____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное или группировочное название: Этанол&	Международное непатентованное или группировочное наименование: Этанол
Лекарственная форма: раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм	Лекарственная форма: раствор для наружного применения
Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 90-95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. При системном применении обладает	Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 90-95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. При системном применении обладает

способностью вызывать анальгезию и общую анестезию. Наиболее чувствительны к этанолу клетки центральной нервной системы, особенно клетки коры головного мозга, воздействуя на которые, этанол вызывает характерное алкогольное возбуждение, связанное с ослаблением процессов торможения. Затем наступает также ослабление процессов возбуждения в коре, угнетение спинного и продолговатого мозга с подавлением деятельности дыхательного центра. Является растворителем для ряда лекарственных средств, а также экстрагентом для ряда веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье. ...	способностью вызывать анальгезию и общую анестезию. Наиболее чувствительны к этанолу клетки центральной нервной системы, особенно клетки коры головного мозга, воздействуя на которые, этанол вызывает характерное алкогольное возбуждение, связанное с ослаблением процессов торможения. Затем наступает также ослабление процессов возбуждения в коре, угнетение спинного и продолговатого мозга с подавлением деятельности дыхательного центра. ...
Показания к применению Лечение начальных стадий заболеваний: фурункулов, панарициев, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к др. антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо). Консервация биологического материала, изготовление лекарственных форм для наружного применения, настоек, экстрактов.	Показания к применению Лечение начальных стадий заболеваний: фурункулов, панарициев, мастит. Обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда). Обработка операционного поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к др. антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо). Консервация биологического материала.
Способ применения и дозы Наружно, в виде примочек.	Способ применения и дозы Наружно, в виде примочек.

Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор. 90 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям. Лекарственные препараты, приготовленные на основе этанола, применяются в соответствии с инструкциями по медицинскому применению данных лекарственных форм.	Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор. 90 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.
Влияние на способность управлять автомобилем и потенциально опасными механизмами Лекарственный препарат, применяемый как раствор для наружного применения, не влияет на способность управлять автомобилем и другими потенциально опасными механизмами. Для лекарственных препаратов, приготовленных на основе этанола, влияние на способность управлять автомобилем и потенциально другими опасными механизмами определяется в соответствии с инструкциями по медицинскому применению для данных лекарственных форм.	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Лекарственный препарат, применяемый как раствор для наружного применения, не влияет на способность управлять автомобилем и другими потенциально опасными механизмами.
Форма выпуска Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%, 70%, 90%.	Форма выпуска Раствор для наружного применения 40%, 70%, 90%. Пс 25, 50, 100 мл во флаконы стеклянные

По 25, 50, 100 мл во флаконы стеклянные с винтовой горловиной оранжевого стекла или во флаконы стеклянные с винтовой горловиной оранжевого или бесцветного стекла, укупоренные алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладкой или укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками. По 25, 50, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата для лекарственных средств. Флаконы герметично укупоривают винтовой крышкой системы «нажать и повернуть» с контролем первого вскрытия или колпачком системы контроля первого вскрытия. По 25, 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена для лекарственных препаратов из полиэтилена высокой плотности низкого давления в комплекте с крышкой с контрольным вскрытием. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл флаконов с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл флаконов с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (для производственных отделов аптек). На коробку (для стационаров), (для	с винтовой горловиной оранжевого или бесцветного стекла, укупоренные алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладкой или укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками. По 25, 50, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата для лекарственных средств. Флаконы герметично укупоривают винтовой крышкой системы «нажать и повернуть» с контролем первого вскрытия или колпачком системы контроля первого вскрытия. По 25, 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена высокой плотности низкого давления для лекарственных препаратов, в комплекте с крышкой с контрольным вскрытием. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Для стационаров: 40 флаконов по 100 мл или 70 флаконов по 50 мл или 70 флаконов по 25 мл с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку из картона. По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры из полиэтилена низкого давления.
---	---

производственных отделов аптек) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющиеся этикетки. По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры из полиэтилена низкого давления (для производственных отделов аптек). На канистру (для стационаров), (для производственных отделов аптек) наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющиеся этикетки. На канистру (для стационаров), (для производственных отделов аптек) приклеивают инструкцию по применению из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющуюся.	
Условия хранения В хорошо укупоренной таре, вдали от источников огня, при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 25° С, в хорошо укупоренной таре, вдали от источников огня. Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска По рецепту.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.

Производитель ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 31 Тел/факс: (495) 522-53-11 (495) 522-97-44. Организация, принимающая претензии ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 31 Тел/факс: (495) 522-53-11 (495) 522-97-44.	Производитель / организация, принимающая претензии: ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия 143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская, д.31 тел./факс: (495) 522-97-44 Адрес производства: Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 18
--	--

Генеральный директор
ПХФК ОАО «Медхимпром»



М.А. Шибасев