

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Доктор Тайсс Эхинацеи настойка

Регистрационный номер: П N011637/01

Торговое наименование: Доктор Тайсс Эхинацеи настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Не присвоено.

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь.

Состав

Состав:

действующее вещество: Эхинацеи травы свежей настойка¹ 33,300 г

вспомогательные вещества: вода очищенная 42,444 г, этанол (спирт этиловый) 96 % 24,256 г.

¹ В качестве действующего вещества используется настойка гомеопатическая матричная.

Описание

Светлая желто-зеленая жидкость с ароматическим запахом. При хранении может образовываться осадок.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства

Растительный препарат оказывает иммуностимулирующее и противовоспалительное действие.

Показания к применению

Профилактика ОРВИ и ОРЗ. Лечение простудных заболеваний и гриппа (начальные стадии в составе комплексной терапии). Инфекционно-воспалительные заболевания носоглотки,

ротовой полости, рецидивирующие инфекции дыхательных и мочевыводящих путей (вспомогательное средство).

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим растениям семейства астровых (сложноцветных);
- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагеноз, саркоидоз и др.);
- состояния иммунодефицита (СПИД и ВИЧ-инфекция) и иммуносупрессии (в т.ч. цитостатическая противоопухолевая терапия, трансплантация органов или костного мозга в анамнезе);
- беременность и период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Существует вероятность возникновения анафилактических реакций у пациентов с атопией. Группу риска также составляют пациенты с эпилепсией, алкоголизмом, с нарушениями функций печени, заболеваниями головного мозга, черепно-мозговой травмой.

Перед приемом препарата следует проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано, поскольку безопасность применения препарата не изучена у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от приемов пищи. Перед применением взбалтывать.

Взрослые и дети старше 12 лет:

- в профилактических целях 3 раза в день по 20-30 капель (в течение нескольких секунд держать во рту, не глотая), в период эпидемий гриппа, ОРВИ и ОРЗ, а также в холодное время года, особенно осенью и зимой;
- при острых состояниях однократно 50 капель, затем по 10-20 капель каждый час, но не более 3 раз в день. При улучшении состояния принимать по 10-20 капель 3 раза в день.

Лечение следует начинать при первых признаках простуды. Если симптомы сохраняются более 10 дней на фоне применения лекарственного препарата или усугубляются, или появляются новые симптомы (в т.ч. высокая температура), следует обратиться к врачу.

Курс профилактического применения препарата в среднем составляет 2 недели.

Средний курс лечения составляет 2 недели. Курс лечения не должен превышать 8 недель.

Для проведения повторных курсов лечения необходима консультация врача.

Побочное действие

Частота побочных реакций представлена согласно следующей классификации: очень часто ($\geq 1/10$), часто (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечасто (от $\geq 1/1000$ до $< 1/100$), редко (от $\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10\ 000$), частота неизвестна (данных для оценки частоты недостаточно).

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Частота неизвестна: аллергические реакции (гиперемия кожи, отек лица, одышка)

Нарушения со стороны сердца

Частота неизвестна: снижение артериального давления.

Нарушения со стороны нервной системы

Частота неизвестна: головокружение

Если любые из указанных в инструкции побочных реакций усугубляются или Вы заметили любые другие побочные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При превышении рекомендованных доз возможно развитие тошноты, рвоты, нарушений пищеварения, головной боли и повышенной возбудимости.

При передозировке показано промывание желудка, а также симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Этанол, входящий в состав, может влиять на эффективность других лекарственных препаратов. Одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими, например, пропиленгликоль или этанол могут привести к накоплению этанола и вызвать нежелательные реакции.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата «Доктор Тайсс Эхинацеи настойка» проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Помутнение и осадок, которые могут образоваться при хранении препарата, не оказывают влияния на его качество и эффективность.

Лекарственный препарат «Доктор Тайсс Эхинацеи настойка» содержит 395 мг спирта (этанола) в каждом мл, что эквивалентно 422 мг/г. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой профилактической дозе препарата (30 капель) составляет 551 мг, в максимальной суточной профилактической дозе (90 капель) – 1652 мг, в максимальной разовой лечебной дозе (50 капель) – 918 мг, максимальной суточной лечебной дозе (110 капель) – 2019 мг.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат содержит этанол (см. раздел «Особые указания»). В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управления транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 50 мл препарата во флаконы коричневого стекла с завинчивающейся крышкой из полипропилена (PP) и пробкой-капельницей из полиэтилена (LDPE). Завинчивающаяся крышка доступна с защитным кольцом из полиэтилена (HDPE) (контролем первого вскрытия) или без него.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещается в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Срок годности после первого вскрытия 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель

Др.Тайсс Натурварен ГмбХ ,

Михелинштрассе 10, 66424 Хомбург, Германия.

Организация, принимающая претензии потребителя

ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус»

142434, Россия, Московская область,

г.о. Богородский, д. Новое Подвязново,

тер. Промплощадка № 1, д. 2, стр. 1, помещ. 304

Тел. +7(495) 980-60-10

Эл.адрес: safety@dtmr.ru

Руководитель департамента регистрации

ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус»



Новикова Н.А.