МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005623-2Я1020
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Респифорб® Комби

наименование лекарственного препарата

Капсул с порошком для ингаляций набор,
200 мкг/доза и 12 мкг/доза, 400 мкг/доза и 12 мкг/доза

лекарственная форма, дозировка

ООО «ПСК Фарма», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

2Я1020

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА Капсул с порошком для ингаляций набор, 200 мкг/доза и 12 мкг/доза, 400 мкг/доза и 12 мкг/доза. По 30 капсул с будесонидом во флакон из полипропилена, укупоренный крышкой из полиэтилена низкой плотности с капсулой гидросорбента. На флакон наклеивают этикетку. По 30 капсул с формотеролом во флакон из полипропилена, укупоренный крышкой из полиэтилена низкой плотности с капсулой гидросорбента. На флакон наклеивают этикетку. По 10 капсул с будесонидом в контурную ячейковую упаковку (блистер) из фольги АЛ и фольги АЛ/ПВХ. По 10 капсул с формотеролом в контурную ячейковую упаковку (блистер) из фольги АЛ и фольги	**ФОРМА ВЫПУСКА** Капсул с порошком для ингаляций набор, 200 мкг/доза и 12 мкг/доза, 400 мкг/доза и 12 мкг/доза. По 30 капсул с будесонидом во флакон из полипропилена, укупоренный крышкой из полиэтилена низкой плотности с капсулой гидросорбента. На флакон наклеивают этикетку. По 30 капсул с формотеролом во флакон из полипропилена, укупоренный крышкой из полиэтилена низкой плотности с капсулой гидросорбента. На флакон наклеивают этикетку. По 10 капсул с будесонидом в контурную ячейковую упаковку (блистер) из фольги АЛ и материала комбинированного ОПА/АЛ/ПВХ. По 10 капсул с формотеролом в контурную

АЛ/ПВХ. По 1, 3, 6 или 12 блистеров с капсулами будесонида и по 3, 6 или 12 блистеров с капсулами формотерола вместе с устройством для ингаляций или без него, инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку. По 1, 2 или 4 флакона с капсулами будесонида и по 1, 2 или 4 флакона с капсулами формотерола вместе с устройством для ингаляций или без него, инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку. На картонную пачку может быть нанесена этикетка контроля первого вскрытия.	ячейковую упаковку (блистер) из фольги АЛ и материала комбинированного ОПА/АЛ/ПВХ. По 1, 3, 6 или 12 контурных ячейковых упаковок (блистеров) с капсулами будесонида и по 3, 6 или 12 контурных ячейковых упаковок (блистеров) с капсулами формотерола вместе с устройством для ингаляций или без него, инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку или в пачку из картона гофрированного. По 1, 2 или 4 флакона с капсулами будесонида и по 1, 2 или 4 флакона с капсулами формотерола вместе с устройством для ингаляций или без него, инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку или в пачку из картона гофрированного. На картонную пачку может быть нанесена этикетка контроля первого вскрытия.
Срок годности 2 года. Не применять препарат по истечении срока годности.	**Срок годности** 2 года. Не применять по истечении срока годности.
Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей ООО «ПСК Фарма», 141983, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2. Тел.: +7(499) 400-16-99. E-mail: pv@rusbiopharm.ru.	**Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей** ООО «ПСК Фарма», 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, помещение 215. Тел.: 8 (800) 234 - 16 - 99. E-mail: pv@rusbiopharm.ru.

Директор клинической разработки и регистрации ЛС
ООО «ПСК Фарма» О.Г. Дегтярева