

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

290822

СОГЛАСОВАНО

МЕТИЛУРАЦИЛ

мазь для местного и наружного применения 10%

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « 290822 » 20__ г

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Метилурацил	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА МЕТИЛУРАЦИЛ
Торговое наименование Метилурацил	Торговое наименование МЕТИЛУРАЦИЛ
Состав <i>Действующее вещество:</i> диоксометилтетрагидропиримидин – 10,0 г. <i>Вспомогательные вещества:</i> вазелин – 45,0 г; ланолин – 31,5 г; вода очищенная – 13,5 г.	Состав на 100 г <i>Действующее вещество:</i> диоксометилтетрагидропиримидин – 10,0 г Вспомогательные вещества: вазелин – 45,0 г ланолин безводный – 31,5 г вода очищенная – 13,5 г
Описание Мазь светло-желтого цвета.	Описание Однородная мазь светло-желтого цвета с характерным запахом.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Наружно. Местно. Мазь ежедневно наносят на пораженные участки тонким слоем в количестве 5-10 г в течении 15-30 дней. Перед применением рану следует обработать антисептическом и удалить остатки некротических тканей. В случае лучевой терапии новообразований гениталий для профилактики и лечения радиоэпителиита мазь используют в рыхлых тампонах. Курс лечения индивидуален.	Способ применения и дозы Наружно. Местно. Мазь ежедневно наносят на пораженные участки тонким слоем в количестве 5-10 г в течении 15-30 дней. Перед применением рану следует обработать антисептиком и удалить остатки некротических тканей. В случае лучевой терапии новообразований гениталий для профилактики и лечения радиоэпителиита мазь используют в рыхлых тампонах. Курс лечения индивидуален.
Форма выпуска Мазь для местного и наружного применения 10 % по 25,0 г или 30,0 г в тубах алюминиевых с внутренним лаковым покрытием с бушонами из полимерных материалов. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.	Форма выпуска Мазь для местного и наружного применения 10 %. По 25 г; 30 г в тубах алюминиевых с внутренним лаковым покрытием с бушонами из полимерных материалов. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Генеральный директор
ЗАО «Зеленая дубрава»



О.Ю. Патеева