ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ГРИМИПЕНЕМ®

Регистрационный номер: ЛСР-008834/08

Изменение № 1

Срок введения Изменения с «30» 09 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Правила приготовления раствора и введения Для приготовления инфузионного раствора во флакон, содержащий 0,5 г имипенема, добавляют 100 мл растворителя. В качестве растворителя следует использовать следующие инфузионные среды: 0.9% раствор натрия хлорида, 5% раствор декстрозы, водный раствор, содержащий 5% декстрозы и 0.9% натрия хлорида. Концентрация имипенема в полученных растворах составляет 5 мг/мл. Вводят внутривенно капельно. Длительность инфузии зависит от выбранной дозы: 250-500 мг вводят за 20-30 мин; 750 – 1000 мг - за 40-60 мин.	**Правила приготовления раствора и введения** *Гримипенем® (имипенем 500 мг и циластатин 500 мг), флаконы стеклянные 125 мл.* Для приготовления инфузионного раствора во флакон, содержащий 0,5 г имипенема, добавляют 100 мл растворителя. В качестве растворителя следует использовать следующие инфузионные среды: 0.9% раствор натрия хлорида, 5% раствор декстрозы, водный раствор, содержащий 5% декстрозы и 0.9% натрия хлорида. Полученный раствор (концентрация имипенема 5 мг/мл) необходимо встряхивать до образования прозрачной жидкости. Различия окрашенности раствора от

Старая редакция	Новая редакция
	желтого до бесцветного не влияют на активность препарата. *Гримипенем® (имипенем 500 мг и циластатин 500 мг), флаконы стеклянные 30 мл.* Приготовление инфузионного раствора проводят в два этапа: 1) для первичного растворения во флакон с порошком антибиотика добавляют 10 мл одного из следующих растворителей: 0.9% раствора натрия хлорида, 5% раствора декстрозы, водного раствора, содержащего 5% декстрозы и 0.9% натрия хлорида; затем флакон встряхивают, добиваясь образования однородной суспензии; 2) полученную суспензию с помощью стерильного шприца переносят во флакон, содержащий 100 мл совместимой инфузионной среды, использованной для первичного растворения. Для того, чтобы полностью перенести содержимое флакона с антибиотиком в раствор для инфузий, описанные выше этапы повторяют еще раз. Вводят внутривенно капельно.

Старая редакция	Новая редакция
	Длительность инфузии зависит от выбранной дозы: 250-500 мг вводят за 20-30 мин; 750 – 1000 мг - за 40-60 мин. Готовый раствор для инфузий (концентрация имипенема 5 мг/мл и менее) может храниться при комнатной температуре в течение 4 ч или в течение 24 ч в холодильнике при температуре 4 °С.

Генеральный директор
ООО «АБОЛмед»

О.М. Карташова

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4