ЛП-№(014924)-(РГ-RU) от 20.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.05.2026 № 9818
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАМФОРНЫЙ СПИРТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Камфорный спирт

Международное непатентованное название или группировочное наименование: камфора

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав

100 мл раствора содержат:

Действующее вещество:

камфора рацемическая – 10 г

Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 70 % – достаточное количество до получения 100 мл.

Описание: прозрачный бесцветный раствор с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает местнораздражающее, антисептическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика

Абсорбция

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению.

Элиминация

Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

Показания к применению

Камфорный спирт показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет.

– Миалгия;

– миозит;

– артралгия;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.05.2026 № 9818
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

– ишиас;

– профилактика образования пролежней.

Противопоказания

– Гиперчувствительность к камфоре рацемической или к любому из вспомогательных веществ;

– нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема);

– детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов).

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Перед применением препарата Камфорный спирт, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Миалгия, миозит, артралгия, ишиас: наносят на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7–10 суток.

Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по медицинскому применению.

Побочное действие

Нежелательные реакции (НР) сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (крапивница).

Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: раздражение кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.05.2026 № 9818
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспалительные участки кожи. После применения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос необходимо тщательно промыть их водой.

Вспомогательные вещества

Этанол (спирт этиловый)

Данный лекарственный препарат содержит 52 мг спирта этилового (этанола) в 100 мл раствора. Может вызвать чувство жжения на поврежденной коже. Огнеопасно. Не использовать вблизи открытого огня, зажженной сигареты или некоторых устройств (например, фенов).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и т.п.).

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 10 %.

По 25 мл, 50 мл или 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками полиэтиленовыми навинчиваемыми или крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления, или из смеси полиэтилена высокого давления с полиэтиленом низкого давления, или из полистирола ударопрочного, или из полипропилена, или колпачками алюминиевыми с накатываемой резьбой и контролем первого вскрытия с уплотнительным элементом.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

По 20 флаконов вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящики из гофрированного картона с прокладками, перегородками или решетками («гнездами») без предварительной укладки в пачки (для стационаров).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.05.2026 № 9818
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Наименование производителя и адрес места производства лекарственного препарата

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, стр. 3, 8, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.