МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ N015826/01- 21 02 13
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ВИДИСИК®

наименование лекарственного препарата

Гель глазной 0,2%

лекарственная форма, дозировка

«Др. Герхард Манн, Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ», Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 21 02 13 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакодинамика Основным компонентом препарата Видисик® является карбомер – высокомолекулярное соединение на основе полиакриловой кислоты, который создает вязкую гидрофильную пленку на поверхности глаза, восполняя недостаток водной фазы слезной жидкости, имитируя муциновый слой и увлажняя конъюнктиву и роговицу, тем самым, препятствуя образованию повреждений эпителия и способствуя его регенерации.	**Фармакодинамика** Основным компонентом препарата Видисик® является карбомер – высокомолекулярное соединение на основе полиакриловой кислоты, который создает вязкую гидрофильную пленку на поверхности глаза, которая связывает воду и стабилизирует слезную пленку.
Способ применения и дозы В зависимости от тяжести и выраженности симптомов (жалоб со стороны пациента) закапывают 3-5 раз в сутки или чаще, а	**Способ применения и дозы** В зависимости от тяжести и выраженности симптомов (жалоб со стороны пациента) закапывают 3-5 раз в сутки или чаще, а

Старая редакция	Новая редакция
также за 30 мин до сна по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок.	также за 30 мин до сна по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок. Для определения длительности применения препарата Видисик®, необходима консультация офтальмолога.
Особые указания При лечении сухого кератоконъюнктивита, вызванного недостаточной продукцией слезной жидкости, либо избыточным слезотечением, либо неблагоприятными внешними воздействиями, и проявляющегося зудом, жжением, ощущением инородного тела в глазу, обычно требующего непрерывной и долгой терапии, необходима консультация офтальмолога. Перед применением препарата Видисик® следует снять контактные линзы. После введения препарата их можно вновь надеть не раньше чем через 15 мин. Если улучшения состояния не отмечается, появляются признаки раздражения глаз, следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу. Не следует прикасаться кончиком пипетки тубы к глазу. Тубу необходимо закрывать после каждого использования.	**Особые указания** Перед применением препарата Видисик® следует снять контактные линзы. После введения препарата их можно вновь надеть не раньше чем через 15 мин. Если улучшения состояния не отмечается, появляются признаки раздражения глаз, следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу. Не следует прикасаться кончиком пипетки тубы к глазу. Тубу необходимо закрывать после каждого использования.
Побочное действие Преходящее «затуманивание» зрения. В отдельных случаях возможна реакция	**Побочное действие** Преходящее «затуманивание» зрения. В отдельных случаях возможна реакция

Старая редакция	Новая редакция
непереносимости к компонентам препарата. Консервант цетримид, входящий в состав препарата, при длительном или слишком частом применении может вызвать местное раздражение глаз, аллергические реакции (жжение, покраснение, ощущение «постороннего тела» в глазу) и повреждение эпителия роговицы. Поэтому при длительном лечении следует избегать применения офтальмологических препаратов, содержащих консерванты.	непереносимости к компонентам препарата. Консервант цетримид, входящий в состав препарата, при длительном или слишком частом применении может вызвать местное раздражение глаз, аллергические реакции (жжение, покраснение, ощущение «инородного тела» в глазу) и повреждение эпителия роговицы. Поэтому при длительном лечении следует избегать применения офтальмологических препаратов, содержащих консерванты.
Взаимодействие с лекарственными препаратами	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Менеджер по регистрации
ООО «Бауш энд Ломб» Блошенко Е.К.