

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Кетофрил®**

(торговое наименование лекарственного средства)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг

(лекарственная форма, дозировка)

**Торрент Фармасыютикалс Лтд., Индия**

(наименование производителя, страна)

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Особые указания</b><br>Риск развития лекарственных осложнений возрастает при удлинении сроков лечения более 5 дней и повышении пероральной дозы препарата более 40 мг/сут.<br>Не следует применять препарат одновременно с пробенецидом, пентоксифиллином, ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП (включая ингибиторы циклооксигеназы-2), солями лития, антикоагулянтами, включая варфарин и гепарин.<br>При совместном приеме с другими НПВП могут наблюдаться задержка жидкости, развитие декомпенсации сердечной деятельности, повышение артериального давления.<br>Пациентам с нарушением свертывания крови препарат назначают только при постоянном контроле числа тромбоцитов и гемостаза, что особенно важно в | <b>Особые указания</b><br>Риск развития лекарственных осложнений возрастает при удлинении сроков лечения более 5 дней и повышении пероральной дозы препарата более 40 мг/сут.<br>Не следует применять препарат одновременно с пробенецидом, пентоксифиллином, ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП (включая ингибиторы циклооксигеназы-2), солями лития, антикоагулянтами, включая варфарин и гепарин.<br>При совместном приеме с другими НПВП могут наблюдаться задержка жидкости, развитие декомпенсации сердечной деятельности, повышение артериального давления.<br>Пациентам с нарушением свертывания крови препарат назначают только при постоянном контроле числа тромбоцитов и гемостаза, что особенно важно в |



| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>послеоперационном периоде. Влияние на агрегацию тромбоцитов прекращается через 24-48 ч.</p> <p>Гиповолемия повышает риск развития побочных реакций со стороны почек. При необходимости можно назначать в комбинации с наркотическими анальгетиками.</p> <p>Не использовать одновременно с парацетамолом более 5 дней.</p> <p>Для снижения риска развития НПВП-гастропатии назначают антацидные лекарственные средства, мизопростол, омепразол.</p> <p><b><i>Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами</i></b></p> <p>Поскольку при приеме кеторолака могут развиваться побочные эффекты со стороны центральной нервной системы (сонливость, головокружение, головная боль и пр.), необходимо соблюдать осторожность при выполнении работ, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций (вождение автотранспорта, занятия другими потенциально опасными видами деятельности).</p> | <p>послеоперационном периоде. Влияние на агрегацию тромбоцитов прекращается через 24-48 ч.</p> <p>Гиповолемия повышает риск развития побочных реакций со стороны почек. При необходимости можно назначать в комбинации с наркотическими анальгетиками.</p> <p>Не использовать одновременно с парацетамолом более 5 дней.</p> <p>Для снижения риска развития НПВП-гастропатии назначают антацидные лекарственные средства, мизопростол, омепразол.</p> <p>При применении кеторолака возрастает риск развития несостоятельности желудочно-кишечного анастомоза в послеоперационном периоде.</p> <p><b><i>Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами</i></b></p> <p>Поскольку при приеме кеторолака могут развиваться побочные эффекты со стороны центральной нервной системы (сонливость, головокружение, головная боль и пр.), необходимо соблюдать осторожность при выполнении работ, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций (вождение автотранспорта, занятия другими потенциально опасными видами деятельности).</p> |

Руководитель отдела регистрации ЛС



Е.П. Гуськова