

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**КСЕФОКАМ РАПИД**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг

Такеда ГмбХ, Германия

Изменение №5

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Ксефокам рапид таблетки покрытые пленочной оболочкой предназначены для приёма внутрь, и их следует принимать, запивая достаточным количеством жидкости. Дозы и режим приема для всех пациентов должны быть основаны на индивидуальной реакции на препарат. Риск возникновения нежелательных явлений может быть значительно уменьшен, если применять препарат в наименьшей эффективной дозе в течение наиболее короткого периода, необходимого для облегчения симптомов. <i>Острая боль</i> Доза лорноксикама составляет 8-16 мг, разовая доза составляет 8 мг. В первые сутки может быть дана начальная доза 16 мг, а спустя 12 ч - еще 8 мг. Далее максимальная рекомендуемая суточная доза составляет 16 мг. <i>Особые группы пациентов</i>	Способ применения и дозы Ксефокам рапид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, предназначены для приёма внутрь, и их следует принимать, запивая достаточным количеством жидкости. Дозы и режим приема для всех пациентов должны быть основаны на индивидуальной реакции на препарат. Риск возникновения нежелательных явлений может быть значительно уменьшен, если применять препарат в наименьшей эффективной дозе в течение наиболее короткого периода, необходимого для облегчения симптомов. <i>Острая боль</i> Доза лорноксикама составляет 8-16 мг, разовая доза составляет 8 мг. В первые сутки может быть дана начальная доза 16 мг, а спустя 12 ч - еще 8 мг. Далее максимальная рекомендуемая суточная доза составляет 16 мг. <i>Особые группы пациентов</i>

Старая редакция	Новая редакция
<i>Дети</i> Лорноксикам не предназначен для применения у детей и подростков младше 18 лет, так как данных по его безопасности и эффективности недостаточно. <i>Пожилые пациенты</i> Специально подбирать дозу пожилым пациентам (старше 65 лет) не требуется, если нет нарушения функции почек или печени. Препарат следует назначать с осторожностью, поскольку в этой возрастной группе нежелательные явления со стороны ЖКТ переносятся хуже. <i>Пациенты с нарушением функции почек</i> У пациентов с легким или умеренным нарушением функции почек рекомендуется уменьшить частоту приема препарата Ксефокам рапид до одного раза в сутки. Лорноксикам противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью <i>Пациенты с нарушением функции печени</i> У пациентов с умеренным нарушением функции печени следует рассмотреть возможность снижения частоты приема препарата до одного раза в сутки. Лорноксикам противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.	<i>Дети</i> Лорноксикам не предназначен для применения у детей и подростков младше 18 лет, так как данных по его безопасности и эффективности недостаточно. <i>Пожилые пациенты</i> Специально подбирать дозу пожилым пациентам (старше 65 лет) не требуется, если нет нарушения функции почек или печени. Препарат следует назначать с осторожностью, поскольку в этой возрастной группе нежелательные явления со стороны ЖКТ переносятся хуже. <i>Пациенты с нарушением функции почек</i> У пациентов с легким или умеренным нарушением функции почек рекомендуется уменьшить частоту приема препарата Ксефокам рапид до одного раза в сутки. Лорноксикам противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью <i>Пациенты с нарушением функции печени</i> У пациентов с умеренным нарушением функции печени следует рассмотреть возможность снижения частоты приема препарата до одного раза в сутки. Лорноксикам противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Форма выпуска Таблетки покрытые пленочной оболочкой, 8 мг. По 6 или 10 таблеток в Ал/Ал блистер. 1, 2 блистера по 6 таблеток или 1, 2, 3, 5, 10 или 25 блистеров по 10 таблеток с	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг. <i>При производстве, фасовке и упаковке на Такеда ГмбХ, Германия:</i> По 6 или 10 таблеток в Ал/Ал блистер.

Старая редакция	Новая редакция
инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	1, 2 блистера по 6 таблеток или 1, 2, 3, 5, 10 или 25 блистеров по 10 таблеток с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку картонную. <i>При производстве, фасовке и упаковке на ООО «Хемофарм», Россия:</i> По 6 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой печатной лакированной и фольги алюминиевой, ламинированной поливинилхлоридной и полиамидной пленкой. По 1 или 2 контурных ячейковых упаковки по 6 таблеток или по 1, 2, 3, 5, 10 или 25 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку картонную.
Производитель Такеда ГмбХ, Германия Леницштрассе 70-98, 16515, Ораниенбург, Германия Takeda GmbH, Germany Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg, Germany Фасовщик/Упаковщик Такеда ГмбХ, Германия Леницштрассе 70-98, 16515, Ораниенбург, Германия Takeda GmbH, Germany Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg, Germany	Производитель/Фасовщик/Упаковщик/Выпускающий контроль качества Такеда ГмбХ, Германия Леницштрассе 70-98, 16515, Ораниенбург, Германия / Takeda GmbH, Germany Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg, Germany или ООО «Хемофарм», Россия 249035, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 62

Старая редакция	Новая редакция
Выпускающий контроль качества Такеда ГмбХ, Германия Леницштрассе 70-98, 16515, Ораниенбург, Германия Takeda GmbH, Germany Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg, Germany	

Представитель фирмы



Резникова В.К.