

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мемантин-Акрихин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша

Изменение № 1

Дата внесения изменения «____» 270121 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав <u>1 таблетка (10 мг) содержит:</u> <i>Активное вещество:</i> мемантина гидрохлорид – 10,00 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 55,00 мг; целлюлоза микрокристаллическая – 47,20 мг; кросповидон – 3,80 мг; кремния диоксид коллоидный – 1,00 мг; магния стеарат – 3,00 мг. <i>Оболочка (Aquarius Prime):</i> гипромеллоза 6сР – 2,50 мг; макрогол-400 – 0,50 мг, титана диоксид (Е 171) – 1,00 мг. <u>1 таблетка (20 мг) содержит:</u> <i>Активное вещество:</i> мемантина гидрохлорид – 20,00 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 110,00 мг; целлюлоза микрокристаллическая – 94,40 мг; кросповидон – 7,60 мг; кремния диоксид коллоидный – 2,00 мг; магния стеарат – 6,00 мг. <i>Оболочка (Aquarius Prime):</i> гипромеллоза 6сР –	Состав <u>1 таблетка (10 мг) содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> мемантина гидрохлорид – 10,00 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>Пленочная оболочка (Покрытие Тип 6):</i> гипромеллоза 6сР, макрогол-400, титана диоксид (Е 171). <u>1 таблетка (20 мг) содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> мемантина гидрохлорид – 20,00 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>Пленочная оболочка (Покрытие Тип 2):</i> гипромеллоза 6сР, макрогол-400, титана диоксид (Е 171), краситель железа оксид красный (Е 172).

5,000 мг; макрогол-400 – 1,000 мг, титана диоксид (Е 171) – 1,936 мг; краситель железа оксид красный (Е 172) – 0,064 мг.	
--	--

Представитель компании



В.В. Чаклина