

ИНСТРУКЦИЯ
 по медицинскому применению лекарственного препарата

Трихопол®
 таблетки вагинальные 500 мг

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

080419

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания В случае трихомониаза рекомендуется одновременное лечение полового партнера препаратом, независимо от того, имеются ли у него проявления заболевания. В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов. При указаниях в анамнезе на изменения в составе периферической крови, а также при использовании препарата в высоких дозах и/или при его длительном применении необходим контроль общего анализа крови. Метронидазол может иммобилизовывать трепонемы, что приводит к ложноположительному ТРІ тесту (тесту Нельсона). Следует обращать внимание больных, особенно водителей транспортных средств и лиц, управляющих другими механизмами,	Особые указания Поскольку одновременное применение препарата с алкоголем (этанолом) может оказывать действие, аналогичное действию дисульфирама (гиперемия кожных покровов, приливы крови к кожным покровам, рвота, тахикардия), следует предупредить пациентов о том, что во время лечения и в течение хотя бы одного дня после окончания применения препарата Трихопол® не следует употреблять алкогольные напитки или лекарственные препараты, содержащие этанол. В случае трихомониаза рекомендуется одновременное лечение полового партнера препаратом, независимо от того, имеются ли у него проявления заболевания. В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Не следует прекращать лечение во время менструаций. После терапии

Старая редакция	Новая редакция
на возможность появления головокружения, связанного с приемом препарата.	трихомониаза следует провести контрольные пробы в течение 3 очередных циклов до и после менструации. Одновременное использование вагинальных таблеток препарата Трихопол® и презерватива или диафрагмы может повысить риск разрыва латекса. При указаниях в анамнезе на изменения в составе периферической крови, а также при использовании препарата в высоких дозах и/или при его длительном применении необходим контроль общего анализа крови. Метронидазол может иммобилизовывать трепонемы, что приводит к ложноположительному ТРІ тесту (тесту Нельсона). Следует обращать внимание больных, особенно водителей транспортных средств и лиц, управляющих другими механизмами, на возможность появления головокружения, связанного с приемом препарата. Сообщалось о случаях тяжелой гепатотоксичности/острой печеночной недостаточности, в том числе, случаях со смертельным исходом с очень быстрым возникновением после начала лечения у пациентов с синдромом Коккейна. Поэтому у данной категории пациентов метронидазол следует использовать с осторожностью и только в случае отсутствия альтернативного лечения. Исследования функции печени должны проводиться непосредственно перед

Изменение № 4 к Инструкции С. 3

Старая редакция	Новая редакция
	началом терапии, во время всего курса терапии и после ее окончания, до тех пор, пока показатели функции печени не будут находиться в пределах нормальных значений или до достижения базовых значений. Если во время лечения наблюдается значительное повышение показателей функции печени, прием препарата следует прекратить. Пациентам с синдромом Коккейна следует рекомендовать немедленно сообщать врачу о развитии любых симптомов потенциального поражения печени (таких как впервые выявленная сохраняющаяся боль в животе, анорексия, тошнота, рвота, лихорадка, недомогание, желтуха, потемнение мочи или кожный зуд).

Представитель компании



Т.А. Ващенко