ЛП-№(013263)-(РГ-RU) от 16.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАЛИПТ ВИАЛАЙН®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт ВИАЛАЙН ®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Мяты перечной листьев масло + Сульфаниламид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта листьев масло

Лекарственная форма: спрей для местного применения

Состав:

1 флакон содержит:	25 мл	30 мл	45 мл	50 мл
Действующие вещества:				
Сульфаниламид натрия (месульфамид, стрептоцид растворимый)	0,625 г	0,750 г	1,125 г	1,250 г
Сульфатиазола натрия пентагидрат (норсульфазол натрия) в пересчете на сульфатиазол натрия безводный	0,625 г 0,472 г	0,750 г 0,566 г	1,125 г 0,849 г	1,250 г 0,943 г
Тимол	0,0125 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Эвкалипта листьев масло	0,0125 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Мяты перечной листьев масло	0,0125 г	0,015 г	0,0225 г	0,025 г
Вспомогательные вещества:				
Этанол (спирт этиловый) 95 %/96 % (в пересчете на безводный)	1,388 г	1,666 г	2,499 г	2,777 г
Сахароза (сахар)	1,250 г	1,500 г	2,250 г	2,500 г
Глицерол (глицерин)	1,750 г	2,100 г	3,150 г	3,500 г
Полисорбат-80 (твин-80)	0,750 г	0,900 г	1,350 г	1,500 г
Вода очищенная	до 25 мл	до 30 мл	до 45 мл	до 50 мл

Описание: жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA20

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки).

Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении микромицетов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Фармакокинетика

Абсорбция

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично абсорбируются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %.

Биотрансформация

В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками.

Элиминация

Период полувыведения стрептоцида составляет 10 часов, сульфатиазола натрия - 1-2 часа.

Показания к применению

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, гортани и носоглотки: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

- гиперчувствительность к мяты перечной листьев маслу, сульфаниламиду, сульфатиазолу, тимолу, эвкалипта листьев маслу или другим компонентам препарата;
- детский возраст (до 3 лет);
- беременность;
- период лактации;
- дефицит сахаразы/изомальтозы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Применение препарата при беременности противопоказано. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия.

Период грудного вскармливания

Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, т.к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Применяется местно.

Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой, кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (при наличии язв или эрозий) с помощью тампона удаляют некротический налет. Свободный конец распылителя ввести в рот и нажать на головку флакона в течение 1-2 сек. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение производят 3-4 раза в сутки.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

Перед применением препарата убедитесь в надежной фиксации распылительной насадки, при необходимости зафиксируйте ее до упора (щелчка).

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

При применении препарата Ингалипт ВИАЛАЙН ® возможны аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

Симптомы

Тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение

Специфический антидот отсутствует, проводятся симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт ВИАЛАЙН ® у детей возможно только по рекомендации врача.

Флакон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Препарат Ингалипт ВИАЛАЙН содержит этанол 95 %/96 % (1,388 г/25 мл, 1,666 г/30 мл, 2,499 г/45 мл, 2,777 г/50 мл). Количество этанола в 25 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 37 мл пива или 13 мл вина. Количество этанола в 30 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 45 мл пива или 15 мл вина. Количество этанола в 45 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 67 мл пива или 23 мл вина. Количество этанола в 50 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 74 мл пива или 25 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

Препарат Ингалипт ВИАЛАЙН содержит сахарозу (1,25 г/25 мл, 1,5 г/30 мл, 2,25 г/45 мл, 2,5 г/50 мл), что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтозы не следует принимать данный лекарственный препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Форма выпуска

Спрей для местного применения.

По 25, 30, 45, 50 мл препарата во флаконы из полиэтилена или полиэтилентерефталата с полимерной крышкой навинчиваемой, или навинчиваемой с контролем первого вскрытия, или с навинчиваемой насадкой-распылителем с защитным колпачком или без колпачка.

Допускается вложение в каждую пачку отдельно лежащей насадки-распылителя с защитным колпачком или без колпачка в пакете полиэтиленовом или без пакета.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре от 5 до 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «АТРАПАК»

Россия, 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж – 3, помещ./ком. IV/145

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27а

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Экспертно-юридический центр» (ООО «ЭЮЦ»),

Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 3, эт. 5, каб. 512

E-mail: pvchief@bloft.ru