

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
211022
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Макмирор®

таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг

«Поликем С.р.л.»,

Виа Дж. Маркора, 11 – 20121, Милан, Италия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « ____ » 211022 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологическое действие: Нифурател – противомикробное средство из группы нитрофуранов; оказывает противопротозойное, противогрибковое и антибактериальное действие. Нифурател обладает высокой эффективностью и низкой токсичностью, что обуславливает широкий спектр его клинического применения. Высокоэффективен в отношении <i>Papilobacter</i> и <i>Helicobacter pylori</i>, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Спектр действия включает: <i>Enterococcus faecalis</i>, <i>Enterococcus faecium</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Shigella flexneri</i> 2a, <i>Shigella flexneri</i> 6, <i>Shigella sonnei</i>, <i>Salmonella typhi</i>, <i>Salmonella typhimurium</i>, <i>Salmonella enteridis</i>, <i>Klebsiella</i> spp, <i>Enterobacter</i> sph., <i>Serratia</i> spp.,	Фармакологическое действие: Нифурател – противомикробное средство из группы нитрофуранов; оказывает противопротозойное, противогрибковое и антибактериальное действие. Нифурател обладает высокой эффективностью и низкой токсичностью, что обуславливает широкий спектр его клинического применения. Высокоэффективен в отношении <i>Papilobacter</i> и <i>Helicobacter pylori</i>, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Спектр действия включает: <i>Enterococcus faecalis</i>, <i>Enterococcus faecium</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Shigella flexneri</i> 2a, <i>Shigella flexneri</i> 6, <i>Shigella sonnei</i>, <i>Salmonella typhi</i>, <i>Salmonella typhimurium</i>, <i>Salmonella enteridis</i>, <i>Klebsiella</i> spp, <i>Enterobacter</i> sph., <i>Serratia</i> spp.,

Изменение № 4 к Инструкции С.2

Старая редакция	Новая редакция
Citrobacter spp., Morganella spp., Rettgerella spp., Pragia fontium, Budvicia aquatica, Rachnella aquatilis и Acinetobacter spp., прочие атипичные энтеробактерии, а также простейшие (трихомонады, амёбы, лямблии); менее активен в отношении Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Является препаратом выбора для терапии сальмонеллезов, шигеллезов и др. острых кишечных бактериальных инфекций. Активен в отношении Trichomonas vaginalis, высокоактивен в отношении грибов рода Candida. Особенно эффективен в отношении штаммов Helicobacter pylori, устойчивых к метронидазолу.	Citrobacter spp., Morganella spp., Rettgerella spp., Pragia fontium, Budvicia aquatica, Rachnella aquatilis и Acinetobacter spp., прочие атипичные энтеробактерии, а также анаэробные бактерии, в том числе Atopobium vaginae, и простейшие (трихомонады, амёбы, лямблии); менее активен в отношении Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Является препаратом выбора для терапии сальмонеллезов, шигеллезов и др. острых кишечных бактериальных инфекций. Активен в отношении Trichomonas vaginalis, высокоактивен в отношении грибов рода Candida. Особенно эффективен в отношении штаммов Helicobacter pylori, устойчивых к метронидазолу.
Показания к применению: • Вульвовагинальные инфекции, вызванные чувствительными к препарату возбудителями (патогенные микроорганизмы, грибы рода Кандида, трихомонады, бактерии, хламидии) • Пиелонефрит, уретрит, цистит, пиелит и другие заболевания мочевыводящей системы. • Кишечный амёбиаз и лямблиоз. • Хронические воспалительные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ассоциированные с инфекцией Helicobacter pylori.	Показания к применению: • Вульвовагинальные инфекции, в том числе бактериальный вагиноз, вызванные чувствительными к препарату возбудителями (патогенные микроорганизмы, грибы рода Кандида, трихомонады, бактерии, включая Atopobium vaginae, хламидии). • Пиелонефрит, уретрит, цистит, пиелит и другие заболевания мочевыводящей системы. • Кишечный амёбиаз и лямблиоз. • Хронические воспалительные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта,

Изменение № 4 к Инструкции С.3

Старая редакция	Новая редакция
	ассоциированные с инфекцией <i>Helicobacter pylori</i> .
Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить претензии можно по адресу: АО «Си Эс Си ЛТД» 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, кор.4, 14 этаж тел./факс: (499) 311 67 71 http://cscpharma.ru	Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить претензии можно по адресу: ООО «Си Эс Си ЛТД» 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, кор.4, 14 этаж Тел.: +7 (499) 311 67 71 http://cscpharma.ru

Специалист по регуляторным вопросам

ООО «Си Эс Си ЛТД»



М.М. Миронова