

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Назол® Адванс**Оксиметазолин****Спрей назальный дозированный 0,025 мг/доза****Институт де Ангели С.р.Л., Италия**

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « ____ » **02 03 22** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Для облегчения носового дыхания при «простудных» заболеваниях и вирусных инфекциях верхних дыхательных путей, синусите, рините любой этиологии. Противопоказания Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам, атрофический (сухой) ринит, закрытоугольная глаукома, состояния после трансфеноидальной гипофизэктомии, хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе), воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа, детский возраст до 6 лет.	Показания к применению Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, обострение вазомоторного ринита, для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите, среднем отите, для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах. Противопоказания • Гиперчувствительность к оксиметазолину и к другим компонентам препарата; • закрытоугольная глаукома; • хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе); • состояние после трансфеноидальной гипофизэктомии; • атрофический (сухой) ринит;


13 97 73

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Интраназально. 1 доза содержит 0,025 мг оксиметазолина гидрохлорида. Взрослым: и детям старше 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Не рекомендуется превышать указанную дозу. <i>Продолжительность лечения</i> Не рекомендуется применять препарат более 3 дней. При частом или длительном применении препарата чувство затруднения носового дыхания может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу. При впрыскивании не запрокидывать голову назад и не распылять в положении «лежа».	• воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа; • детский возраст до 12 лет. Способ применения и дозы Интраназально. Для спрея: взрослые и дети старше 12 лет – по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1 – 2 раза в день. Препарат применяется от 3 до 5 дней. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять препарат не более 7 дней. Если симптомы усиливаются или улучшения не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Повторный курс препарата возможен только спустя несколько дней, в течение которых препарат не применялся. При частом и длительном применении препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. В этом случае следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

Специалист по регистрации



Грюнвальд М.А.



139773