

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Омитокс Гастро®

капсулы, 10 мг, 20 мг

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия

Изменение № 1

310821

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 202_ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению <i>Взрослые</i> ✓ язва двенадцатиперстной кишки ✓ язва желудка ✓ НПВП ассоциированные язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки ✓ эрадикация <i>Helicobacter pylori</i> при язвенной болезни (в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией) ✓ рефлюкс эзофагит ✓ симптоматическая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь ✓ диспепсия, связанная с повышенной кислотностью ✓ синдром Золлингера-Эллисона. <i>Дети и подростки</i> <u>Дети старше 2 лет с массой тела не менее 20 кг</u> ✓ рефлюкс эзофагит	Показания к применению <i>Дозировка 10 мг</i> ✓ Симптомы диспепсии, связанные с повышенной кислотностью желудочного сока, в том числе симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) (изжога, кислая отрыжка). ✓ Длительная поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов ГЭРБ (профилактика рецидивов изжоги). ✓ Длительная поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов язвы двенадцатиперстной кишки. <i>Дозировка 20 мг</i> <i>Взрослые</i> ✓ Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение и профилактика). ✓ НПВП-ассоциированные язвы и эро-

Старая редакция	Новая редакция
✓ симптоматическая гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь. <u>Дети старше 4 лет и подростки</u> ✓ язва двенадцатиперстной кишки, вызванная <i>Helicobacter pylori</i>.	зии желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение и профилактика). ✓ Эрадикация <i>Helicobacter pylori</i> при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией). ✓ Рефлюкс-эзофагит. ✓ Симптоматическая гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ✓ Диспепсия, связанная с повышенной кислотностью. ✓ Синдром Золлингера-Эллисона. <u>Дети и подростки</u> <u>Дети старше 2-х лет с массой тела не менее 20 кг</u> ✓ Рефлюкс-эзофагит. ✓ Симптоматическое лечение изжоги и отрыжки кислым при ГЭРБ. <u>Дети старше 4-х лет и подростки</u> ✓ Эрадикация <i>Helicobacter pylori</i> при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией).
Противопоказания - известная повышенная чувствительность к омепразолу, замещенным бензимидазолам или другим компонентам, входящим в состав препарата Омитокс Гастро® - дефицит сахаразы/изомальтазы, не-	Противопоказания <u>Дозировка 10 мг</u> известная повышенная чувствительность к омепразолу, замещенным бензимидазолам или другим компонентам, входящим в состав препарата Омитокс Гастро®;

Старая редакция	Новая редакция
переносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция • одновременный прием с эрлотинибом, позаконазолом • детский возраст до 2 лет • детский возраст старше 2 лет по другим показаниям, кроме лечения рефлюкс эзофагита и симптоматической гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни • детский возраст старше 4 лет по другим показаниям, кроме лечения рефлюкс эзофагита, симптоматической гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни и язвы двенадцатиперстной кишки, вызванной <i>Helicobacter pylori</i>.	• дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; • одновременное применение с кларитромицином у пациентов с печеночной недостаточностью, атазанавиром, зверобоем, эрлотинибом, позаконазолом, нелфинавиром; • детский возраст до 18 лет. <i>Дозировка 20 мг</i> • известная повышенная чувствительность к омепразолу, замещенным бензимидазолам или другим компонентам, входящим в состав препарата Омитокс Гастро®; • дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; • одновременное применение с кларитромицином у пациентов с печеночной недостаточностью, атазанавиром, зверобоем, эрлотинибом, позаконазолом, нелфинавиром; • детский возраст старше 2-х лет и с массой тела ≤ 20 кг по другим показаниям, кроме рефлюкс-эзофагита и симптоматическом лечении изжоги и отрыжки кислым содержимым при ГЭРБ; • детский возраст старше 4-х лет по другим показаниям, кроме эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (в комбинации с соответствующей

Старая редакция	Новая редакция
С осторожностью Пациенты с остеопорозом. При наличии таких симптомов, как значительная спонтанная потеря в весе, частая рвота, дисфагия, рвота с кровью или меле-на, а также при наличии язвы желудка (или подозрении на язву желудка) следует исключить наличие злокачественного новообразования, поскольку лечение может привести к маскировке симптомов и, таким образом, задержать постановку диагноза.	антибактериальной терапией); • детский возраст до 18 лет по другим показаниям. С осторожностью Недостаточность функции печени; недостаточность функции почек; остеопороз; одновременное применение с кларитромицином, клопидогрелом, итраконазолом, варфарином, цилостазолом, диазепамом, фенитоином, саквинавиром, такролимусом, вориконазолом, рифампицином; значительное спонтанное снижение массы тела; повторяющаяся рвота, рвота с примесью крови; нарушение глотания; изменение цвета кала (дегтеобразный стул); а также при наличии язвы желудка (или при подозрении на ее наличие) до начала лечения следует исключить злокачественное новообразование, поскольку лечение может привести к маскировке симптомов и задержать постановку правильного диагноза.
Способ применения и дозы Внутрь, запивая небольшим количеством воды (содержимое капсулы нельзя разжевывать). При возникновении трудностей с проглатыванием целой капсулы, можно проглотить ее содержимое после вскрытия или рассасывания капсулы, а также можно смешать содержимое капсулы со слегка подкисленной жидкостью (соком или йогуртом) и использовать полученную суспензию в течение 30 минут. Не применять с	Способ применения и дозы Для приема внутрь. Капсулы принимают обычно утром, предпочтительно отдельно от еды, глотают целиком, запивая небольшим количеством воды. Содержимое капсулы нельзя разжевывать или измельчать. При возникновении трудностей с проглатыванием целой капсулы, можно проглотить ее содержимое после вскрытия или рассасывания капсулы, а также можно смешать содержимое капсулы со

Старая редакция	Новая редакция
молоком или газированной водой. <u>Взрослые</u> <i>Язва двенадцатиперстной кишки</i> Пациентам с активной язвой двенадцатиперстной кишки рекомендуется принимать Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. У большинства пациентов заживление язвы наступает в течение 2-х недель. В тех случаях, когда в течение 2-х недель полное заживление язвы не наступает, заживление достигается при последующем 2-х недельном приеме препарата Омитокс Гастро®. Пациентам с язвой двенадцатиперстной кишки, мало восприимчивой к лечению, обычно назначают Омитокс Гастро® 40 мг 1 раз в сутки; заживление язвы обычно наступает в течение 4 недель. Для предотвращения рецидивов пациентам с язвой двенадцатиперстной кишки рекомендуют Омитокс Гастро® 10 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости дозу можно увеличить до 20-40 мг 1 раз в сутки. <i>Язва желудка</i> Рекомендуемая доза Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. У большинства пациентов излечение наступает в течение 4 недель. В тех случаях, когда после первого курса приема препарата полное заживление не наступает, обычно назначают повторный 4-недельный курс лечения, в течение которого достигается заживление.	слегка подкисленной жидкостью (соком или йогуртом) и использовать полученную суспензию в течение 30 минут. Не применять с молоком или газированной водой. <i>Дозировка 10 мг</i> Препарат Омитокс Гастро® принимают в дозе 10 мг 1 раз в сутки. Не превышайте рекомендованную дозу. При отсутствии эффекта в течение трех дней необходим осмотр специалиста. Максимальный курс лечения без консультации врача 14 дней. <i>Дозировка 20 мг</i> <u>Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки</u> При обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки рекомендуется принимать препарат по 20 мг 1 раз в сутки. Обычно продолжительность терапии составляет 2 недели, при необходимости возможно увеличение курса терапии еще на 2 недели. Пациентам с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, резистентной к лечению, обычно назначают препарат 40 мг 1 раз в сутки в течение 4-х недель. Для профилактики рецидивов пациентам с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки – 20 мг 1 раз в сутки; в некоторых случаях может быть достаточно 10 мг 1 раз в сутки (необходимо принимать капсулы, содержащие 10 мг омепразола). В случае необходимости дозу можно увеличить до 40 мг 1 раз в сутки. <u>Язвенная болезнь желудка</u> При обострении язвенной болезни желудка

Старая редакция	Новая редакция
Пациентам с язвой желудка, мало восприимчивой к лечению, обычно назначают Омитокс Гастро® 40 мг 1 раз в сутки; заживление обычно достигается в течение 8 недель. Для предотвращения рецидивов пациентам с язвой желудка рекомендуют Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости дозу можно увеличить до 40 мг 1 раз в сутки. <i>НПВП ассоциированные язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки</i> При наличии НПВП ассоциированных язв желудка, двенадцатиперстной кишки или гастродуоденальных эрозиях у пациентов с продолжающейся терапией НПВП или после ее прекращения рекомендуемая доза препарата Омитокс Гастро® - 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов, у большинства пациентов излечение наступает в течение 4 недель. У тех пациентов, у которых не произошло излечение в течение начального периода терапии, заживление обычно достигается при повторном 4-х недельном приеме препарата. Для профилактики язв и эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки и симптомов диспепсии, связанных с приемом НПВП, рекомендованная доза препарата Омитокс Гастро® - 20 мг 1 раз в сутки. <i>Эрадикация Helicobacter pylori при язвенной болезни (в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией)</i>	рекомендуемая доза препарата составляет 20 мг 1 раз в сутки. Продолжительность терапии - 4 недели. В тех случаях, когда после первого курса применения препарата полное заживление не наступает, назначают повторный 4-недельный курс лечения. Пациентам с язвенной болезнью желудка, резистентной к лечению, обычно назначают препарат 40 мг 1 раз в сутки, заживление обычно достигается в течение 8 недель. Для профилактики рецидивов пациентам с язвенной болезнью желудка рекомендуют принимать препарат в дозе 20 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости дозу можно увеличить до 40 мг 1 раз в сутки. Режимы эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> при язвенной болезни: - омепразол по 20 мг, кларитромицин по 500 мг, амоксициллин по 1000 мг одновременно 2 раза в сутки в течение 1 недели; - омепразол по 20 мг, кларитромицин по 250 мг (в качестве альтернативы 500 мг), метронидазол по 400 мг (или по 500 мг, или тинидазол по 500 мг) одновременно 2 раза в сутки в течение 1 недели; - омепразол по 40 мг 1 раз в сутки, а также амоксициллин по 500 мг с метронидазолом по 400 мг (или по 500 мг, или тинидазолом по 500 мг) оба 3 раза в сутки на протяжении 1 недели. В тех случаях, если после проведенного лечения пациент <i>Helicobacter pylori</i>-положительный, возможен повторный курс лечения.

Старая редакция	Новая редакция
<i>Режимы эрадикации <i>Helicobacter pylori</i> при язвенной болезни</i> <u>Трехкомпонентная схема лечения:</u> Омитокс Гастро® 20 мг, амоксициллин 1 г и кларитромицин 500 мг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение одной недели или Омитокс Гастро® 20 мг, метронидазол 400 мг (или тинидазол 500 мг) и кларитромицин 250 мг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение одной недели или Омитокс Гастро® 40 мг 1 раз в сутки, а также амоксициллин 500 мг и метронидазол 400 мг 3 раза в сутки в течение одной недели. <u>Двухкомпонентная схема лечения:</u> Омитокс Гастро® 40-80 мг ежедневно и амоксициллин 1,5 г ежедневно (дозу следует делить на части) в течение двух недель. Во время клинических испытаний применяли амоксициллин в суточной дозе 1,5-3 г, омепразол 40 мг 1 раз в сутки и кларитромицин 500 мг 3 раза в сутки в течение двух недель. Для обеспечения полного заживления дальнейшего лечение проводить в соответствии с рекомендациями в разделах «Язва двенадцатиперстной кишки» и «Язва желудка». В тех случаях, когда после прохождения курса лечения тест на <i>Helicobacter pylori</i> остается положительный, курс лечения может быть повторен.	<u>Лечение язвенно-эрозивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП</u> Рекомендуемая доза омепразола составляет 20 мг 1 раз в сутки. Курс лечения – 4 недели. Для пациентов, у которых не наступило заживление язвы, курс может быть продлен еще на 4 недели. <u>Профилактика язвенно-эрозивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП</u> В качестве профилактики НПВП-ассоциированных язвенно-эрозивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов в группе риска (возраст более 60 лет, язвенно-эрозивные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, кровотечения из верхних отделов ЖКТ в анамнезе) рекомендуемая доза – 20 мг омепразола 1 раз в сутки. <u>Лечение рефлюкс-эзофагита</u> Рекомендуемая доза составляет 20 мг омепразола 1 раз в сутки. Курс лечения составляет 4 недели. Для пациентов, у которых не наступило излечение за этот срок, курс может быть продлен на 4 недели. При тяжелом эзофагите рекомендуемая доза составляет 40 мг омепразола 1 раз в сутки, и курс лечения составляет 8 недель. Для поддерживающей терапии у пациентов с рефлюкс-эзофагитом рекомендуемая доза омепразола составляет 10 мг 1 раз в сутки (необходимо принимать капсулы, содержащие 10 мг омепразола). При необходимости

Старая редакция	Новая редакция
<i>Рефлюкс эзофагит</i> Рекомендуемая доза - по одной капсуле Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. У большинства пациентов излечение наступает в течение 4 недель. В тех случаях, когда после первого курса приема препарата полное излечение не наступает, обычно назначают повторный 4-недельный курс лечения, в течение которого достигается излечение. Пациентам с тяжелой формой рефлюкс эзофагита рекомендуется прием препарата Омитокс Гастро® 40 мг 1 раз в сутки; излечение обычно наступает в течение 8 недель. Пациентам с рефлюкс эзофагитом в стадии ремиссии назначают Омитокс Гастро® 10 мг 1 раз в сутки в виде длительных курсов поддерживающей терапии. В случае необходимости дозу можно увеличить до 20-40 мг. <i>Симптоматическая гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь</i> Рекомендуемая доза – Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. Терапевтический эффект может достигаться при ежедневной дозе 10 мг, поэтому не исключается индивидуальный подбор дозы. Если после 4 недель лечения (Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки) симптомы не исчезают, рекомендуется дополнительное обследование пациента. <i>Диспепсия, связанная с повышенной кис-</i>	доза может быть увеличена до 20-40 мг 1 раз в сутки. <u>Симптоматическое лечение ГЭРБ</u> Рекомендуемая доза – 20 мг 1 раз в сутки. Возможна индивидуальная корректировка дозы. Если симптомы сохраняются после 4 недель лечения в дозе 20 мг омепразола ежедневно, то требуется дальнейшее обследование. <u>Диспепсия, связанная с повышенной кислотностью</u> Обычная доза составляет 10 мг в сутки. Максимальная суточная доза препарата не должна превышать 20 мг. Максимальный курс лечения – 14 дней. Если в течение 2 недель не наблюдается облегчение симптомов или они усугубляются, необходимо обратиться к врачу. <u>Лечение синдрома Золлингера-Эллисона</u> Доза устанавливается индивидуально. Рекомендуемая начальная доза – 60 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу увеличивают до 80-120 мг в сутки. При дозе более 80 мг ее следует разделить на 2 приема. <u>Применение у детей старше 2-х лет и массой тела ≥ 20 кг при лечении рефлюкс-эзофагита и симптоматическом лечении изжоги и отрыжки кислым содержимым при ГЭРБ</u> Рекомендуемая доза - 20 мг 1 раз в сутки. Доза может быть увеличена до 40 мг 1 раз в сутки при необходимости. Курс лечения при рефлюкс-эзофагите – 4-8 недель, при симптоматическом лечении изжоги и от-

Старая редакция	Новая редакция						
<i>лотностью</i> Для облегчения болей и/или устранения ощущений дискомфорта в эпигастральной области, с изжогой или без изжоги, назначают Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки. Терапевтический эффект может достигаться при дозе 10 мг 1 раз в сутки, поэтому лечение можно начинать с этой дозы. Если после 4 недель лечения (Омитокс Гастро® 20 мг 1 раз в сутки) симптомы не исчезают, рекомендуется дополнительное обследование пациента. <i>Синдром Золлингера-Эллисона</i> Пациентам с синдромом Золлингера-Эллисона препарат назначают в индивидуальной дозировке. Лечение продолжают по клиническим показаниям настолько долго, насколько это необходимо. Рекомендуемая начальная доза – Омитокс Гастро® 60 мг ежедневно. У всех пациентов с тяжелой формой заболевания, а также в тех случаях, когда другие терапевтические методы не привели к желаемому результату, применение препарата было эффективным у более 90 % пациентов при приеме 20-120 мг Омитокс Гастро® ежедневно. В тех случаях, когда суточная доза препарата превышает 80 мг, дозу следует делить на две части и принимать 2 раза в сутки. <u>Дети и подростки</u> <i>Рефлюкс эзофагит и симптоматическая гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь</i> Детям в возрасте старше 2 лет с массой тела более 20 кг назначают препарат Омитокс	рыжки кислым при ГЭРБ – 2-4 недели. При сохранении симптомов спустя 2-4 недели пациенту требуется дополнительное обследование. <u>Лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, вызванной <i>Helicobacter pylori</i> у детей старше 4-х лет</u> При выборе соответствующей комбинированной терапии необходимо принимать во внимание официальные местные и национальные рекомендации с точки зрения бактериальной резистентности, длительность лечения (чаще всего 7 дней, но иногда может потребоваться до 14 дней) и соответствующие антибактериальные средства. Лечение проводится под наблюдением специалиста. <table border="1" data-bbox="879 1133 1493 2029"> <thead> <tr> <th data-bbox="879 1133 1023 1245">Масса тела</th><th data-bbox="1023 1133 1493 1245">Схема лечения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="879 1245 1023 1637">15-30 кг</td><td data-bbox="1023 1245 1493 1637">Омитокс Гастро® 10 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.</td></tr> <tr> <td data-bbox="879 1637 1023 2029">31-40 кг</td><td data-bbox="1023 1637 1493 2029">Омитокс Гастро® 20 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.</td></tr> </tbody> </table>	Масса тела	Схема лечения	15-30 кг	Омитокс Гастро® 10 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.	31-40 кг	Омитокс Гастро® 20 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.
Масса тела	Схема лечения						
15-30 кг	Омитокс Гастро® 10 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.						
31-40 кг	Омитокс Гастро® 20 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.						

Старая редакция		Новая редакция	
Гастро® в дозе 20 мг в один раз сутки. При необходимости возможно увеличение дозы до 40 мг один раз в сутки. Рекомендуемая продолжительность лечения в случае рефлюкс эзофагита составляет 4-8 недель. Рекомендуемая продолжительность лечения в случае симптоматической гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни составляет 2-4 недели. Если после 2-4 недель лечения контроль симптомов заболевания не был достигнут, рекомендуется дополнительное обследование пациента. <i>Язва двенадцатиперстной кишки, вызванная Helicobacter pylori</i> При выборе схемы терапии следует учитывать официальные национальные, региональные и местные рекомендации, касающиеся резистентности микроорганизмов к антибактериальным средствам, продолжительности терапии (наиболее часто -7 дней, но в ряде случаев - до 14 дней) и правильного применения антибактериальных препаратов. Терапию необходимо проводить под наблюдением специалиста. Для детей в возрасте старше 4 лет рекомендуется следующая схема лечения:		> 40 кг	Омитокс Гастро® 20 мг, амоксициллин и кларитромицин (назначаются в режиме дозирования согласно ИМП данных препаратов). Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение 1 недели.
<u>Особые группы пациентов</u>			
<i>Нарушение функции почек</i>			
Для пациентов с нарушением функции почек коррективка дозы не требуется.			
<i>Нарушение функции печени</i>			
Для пациентов с нарушением функции печени назначают по 10-20 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 20 мг).			
<i>Пациенты пожилого возраста</i>			
Для пациентов пожилого возраста коррективка дозы не требуется.			

Масса тела	Схема лечения
15-30 кг	Омитокс Гастро® 10 мг, амоксициллин 25 мг/кг и кларитромицин 7,5 мг/кг. Все препараты принимать 2 ра-

Старая редакция		Новая редакция
	за в сутки в течение недели.	
31-40 кг	Омитокс Гастро® 20 мг, амоксциллин 750 мг и кларитромицин 7,5 мг/кг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение недели.	
> 40 кг	Омитокс Гастро® 20 мг, амоксциллин 1 г и кларитромицин 500 мг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение недели.	
<u>Особые группы пациентов</u> <i>Нарушение функции почек</i> Для пациентов с нарушением функции почек коррективная доза не требуется. <i>Нарушение функции печени</i> У пациентов с нарушением функции печени биодоступность и период полувыведения омепразола из плазмы увеличиваются. В связи с этим доза 10-20 мг в сутки является достаточной. <i>Пациенты пожилого возраста</i> Для пациентов пожилого возраста коррективная доза не требуется. Условия отпуска Отпускают по рецепту.		Условия отпуска <i>Дозировка 10 мг</i> Отпускают без рецепта. <i>Дозировка 20 мг</i> Отпускают по рецепту.

Менеджер по регистрации



Попова Е.А.