

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Дазолик® Леди**

наименование лекарственного препарата

Таблетки вагинальные, 500 мг

лекарственная форма, дозировка

Абди Ибрахим Иляч Санайи ве Тидж А.Ш., Турция

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению - уrogenитальный трихомониаз; - неспецифический вагинит различной этиологии, подтвержденный клиническими и микробиологическими данными; - санация влагалища перед гинекологическими операциями.	Показания к применению - уrogenитальный трихомониаз; - бактериальный вагиноз, подтвержденный клиническими и лабораторными данными; - санация влагалища перед гинекологическими операциями.
Способ применения и дозы Интравагинально. Вагинальную таблетку следует вводить глубоко во влагалище, в положении «лежа» на спине, после гигиенической обработки наружных половых органов. Во время менструации препарат применяют по обычной схеме. <i>При трихомониазе:</i> Интравагинально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед сном в течение 5 дней. Назначают в составе комплексной терапии с препаратом Дазолик®, таблетки,	Способ применения и дозы Интравагинально. Вагинальную таблетку следует вводить глубоко во влагалище, в положении «лежа» на спине, после гигиенической обработки наружных половых органов. Во время менструации препарат применяют по обычной схеме. <i>При трихомониазе:</i> Интравагинально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед сном в течение 5 дней. Назначают в составе комплексной терапии с препаратом Дазолик®, таблетки,

Старая редакция	Новая редакция
покрытые пленочной оболочкой, 0,5 г. <i>При неспецифическом вагините:</i> Интравагинально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед сном в течение 6-7 дней. <i>Для санации влагалища перед гинекологическими операциями:</i> Интравагинально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед сном в течение 6 дней.	покрытые пленочной оболочкой, 0,5 г. <i>При бактериальном вагинозе:</i> Интравагинально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед сном в течение 6-7 дней. <i>Для санации влагалища перед гинекологическими операциями:</i> Интравагинально по 1 вагинальной таблетке 500 мг ежедневно перед сном в течение 6 дней.

Руководитель отдела регистрации ЛС



Сулейманов Р. Р.