МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
24.04.2023
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Антигриппин-Экспресс

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
[лимон, малина, черная смородина]

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия,
ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 24.04.2023 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Применяется при острых респираторных заболеваниях, острых респираторных вирусных инфекциях, ринофарингите для облегчения следующих сиптомов: • ринорея, заложенность носа; • головная боль; • повышенная температура тела; • слезотечение; • чихание.	**Показания к применению** Применяется при острых респираторных заболеваниях, острых респираторных вирусных инфекциях, ринофарингите для облегчения следующих симптомов: • ринорея, заложенность носа; • головная боль; • повышенная температура тела; • слезотечение; • чихание.
Способ применения и дозы Далее по тексту раздела. У пациентов с хроническими или декомпенсированными заболеваниями печени, у пациентов с печеночной недостаточностью, хроническим алкоголизмом, у истощенных пациентов и	**Способ применения и дозы** Далее по тексту раздела. У пациентов с хроническими или декомпенсированными заболеваниями печени, у пациентов с печеночной недостаточностью, хроническим алкоголизмом, у истощенных пациентов и

Старая редакция	Новая редакция
при обезвоживании суточная доза парацетамола не должны превышать 3 г. Далее по тексту раздела. **Передозировка** *Симптомы, обусловленные парацетамолом* Далее по тексту раздела. *Лечение* Немедленная госпитализация. Промывание желудка в течении первых часов отравления, прием энтеросорбентов (активированный уголь, лигнин гидролизный). Далее по тексту раздела.	при обезвоживании суточная доза парацетамола не должна превышать 3 г. Далее по тексту раздела. **Передозировка** *Симптомы, обусловленные парацетамолом* Далее по тексту раздела. *Лечение* Немедленная госпитализация. Промывание желудка в течение первых часов отравления, прием энтеросорбентов (активированный уголь, лигнин гидролизный). Далее по тексту раздела.

Руководитель медицинского управления
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Воронцов В. В.

Воронцов В.В.
По доверенности
№ Ш051271 от 01.12.22

Закрытое акционерное общество ГР № 116702 ФармФирма "Сотекс" для документов Москва