

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Акорта®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 310718 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждая таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> розувастатин кальция – 10,40 мг или 20,80 мг (в пересчете на безводное вещество, что эквивалентно содержанию розувастатина – 10,00 мг или 20,00 мг); <i>вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> для дозировки 10 мг – лактозы моногидрат (сахар молочный) – 89,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 29,82 мг, кальция гидрофосфат (Е 341) – 10,90 мг, кросповидон – 7,50 мг, магния стеарат – 1,88 мг; для дозировки 20 мг – лактозы моногидрат (сахар молочный) – 179,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 59,64 мг, кальция гидрофосфат (Е 341) – 21,80 мг, кросповидон – 15,00 мг, магния стеарат – 3,76 мг.	Состав Каждая таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> розувастатин кальция – 10,40 мг или 20,80 мг, что эквивалентно содержанию розувастатина – 10,00 мг или 20,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> для дозировки 10 мг – лактозы моногидрат (сахар молочный) – 89,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 29,82 мг, кальция гидрофосфат (Е 341) – 10,90 мг, кросповидон – 7,50 мг, магния стеарат – 1,88 мг; для дозировки 20 мг – лактозы моногидрат (сахар молочный) – 179,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 59,64 мг, кальция гидрофосфат (Е 341) – 21,80 мг, кросповидон – 15,00 мг, магния стеарат – 3,76 мг. <i>оболочка:</i> для дозировки 10 мг – ОПАДРАЙ

Старая редакция	Новая редакция
<i>оболочка:</i> для дозировки 10 мг – ОПАДРАЙ II 30K240001 Розовый (OPADRY II 30K240001 Pink) [лактозы моногидрат (сахар молочный) – 2,40 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 1,68 мг, титана диоксид – 1,413 мг, триацетин (глицерил триацетат) – 0,48 мг, краситель железа оксид красный – 0,027 мг] – 6,00 мг; для дозировки 20 мг – ОПАДРАЙ II 30K240001 Розовый (OPADRY II 30K240001 Pink) [лактозы моногидрат (сахар молочный) – 4,80 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 3,36 мг, титана диоксид – 2,826 мг, триацетин (глицерил триацетат) – 0,96 мг, краситель железа оксид красный – 0,054 мг] – 12,00 мг. Описание Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до розового цвета, круглые, двояковыпуклые. На изломе от белого до кремового цвета. Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	II 30K240001 Розовый (OPADRY II 30K240001 Pink) [лактозы моногидрат (сахар молочный) – 2,40 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 1,68 мг, титана диоксид – 1,413 мг, триацетин (глицерил триацетат) – 0,48 мг, краситель железа оксид красный – 0,027 мг] – 6,00 мг; для дозировки 20 мг – ОПАДРАЙ II 30K240001 Розовый (OPADRY II 30K240001 Pink) [лактозы моногидрат (сахар молочный) – 4,80 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 3,36 мг, титана диоксид – 2,826 мг, триацетин (глицерил триацетат) – 0,96 мг, краситель железа оксид красный – 0,054 мг] – 12,00 мг. Описание Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до розового цвета, круглые, двояковыпуклые. На срезе от белого до кремового цвета. Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"



Е.В. Толстова