



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## Тауфрин®

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.*

- *Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Тауфрин®

**Международное непатентованное наименование:** таурин

**Лекарственная форма:** капли глазные

**Состав**

*Действующее вещество:*

Таурин — 40 мг

*Вспомогательные вещества:*

метилпарагидроксибензоат — 1 мг

гидроксиэтилцеллюлоза — 2 мг

вода для инъекций — до 1 мл

**Описание**

Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** метаболическое средство.

**Код АТХ:** S01XA

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе метаболизма цистеина.

Оказывает ретинопротекторное (при субконъюнктивальном введении) и метаболическое действие.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления катионов калия и кальция, улучшения условий проведения нервного импульса.

### **Фармакокинетика**

При местном применении системная абсорбция низкая.

### **Показания к применению**

Препарат применяют в составе комплексной терапии при дистрофии роговицы, катаракте (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая), травме роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).

Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с местными  $\beta$ -адреноблокаторами (для улучшения оттока внутриглазной жидкости)).

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ препарата, детский возраст (до 18 лет).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период грудного вскармливания нет. Возможно применение таурина для лечения во время беременности и в период грудного вскармливания по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов для плода и ребенка.

*Перед применением препарата Тауфрин<sup>®</sup>, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.*

*В период грудного вскармливания перед применением препарата Тауфрин<sup>®</sup> необходимо проконсультироваться с врачом.*

### **Способ применения и дозы**

При катаракте препарат назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с местными  $\beta$ -адреноблокаторами) по 1-2 капли 2 раза в день за 15-20 минут до назначения одного из местных  $\beta$ -адреноблокаторов, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

*Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

**Побочное действие**

Аллергические реакции.

*Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

**Передозировка**

Данные о передозировке отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможно совместное применение таурина с тимололом. Случаев негативного лекарственного взаимодействия таурина с другими препаратами, применяющимися в офтальмологии, не описано.

У пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено увеличение гипотензивного действия  $\beta$ -адреноблокаторов (бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола или тимолола и других) в случае совместного применения с таурином.

*Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Тауфрин<sup>®</sup> проконсультируйтесь с врачом.*

**Особые указания**

Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 минут после него. При необходимости одновременного применения других офтальмологических лекарственных средств (глазные капли и другие), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.

После вскрытия использовать в течение 30 суток.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Данные о возможности отрицательного влияния таурина при офтальмологическом применении на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами и механизмами) отсутствуют.

**Форма выпуска**

Капли глазные, 4 %.

По 1 мл, 1,5 мл, 2 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

1 тубик-капельницу по 1 мл, 5 мл, 10 мл или 5, 10 тубик-капельниц по 1 мл, 1,5 мл, 2 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.pfk-obnovlenie.ru](http://www.pfk-obnovlenie.ru)

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)

Директор по регистрации

АО «ПФК Обновление»



Е. В. Кустова