


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

НЕМОЗОЛ®

Nemozole®



таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 400 мг

Ипка Лабораториз Лимитед, Индия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения " 260516 " 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит: <i>Активное вещество:</i> албендазол – 200/400 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> кукурузный крахмал - 123,00/97,00 мг, лаурилсульфат натрия - 4,00/5,00 мг, повидон-30 - 3,350/5,00 мг, метилпарабен - 0,270/0,360 мг, пропилпарабен - 0,030/0,040 мг, желатин - 3,70/5,480 мг, очищенный тальк - 6,70/12,00 мг, крахмал гликолят натрия - 3,350/5,20 мг, коллоидный диоксид кремния - 2,00/3,00 мг, крахмал - 6,70/0 мг, магния стеарат - 2,00/3,00 мг. Оболочка: гидроксипропилметилцеллюлоза - 2,40/6,640 мг, диоксид титана - 1,80/4,00 мг,	Состав: Каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит: <i>Активное вещество:</i> албендазол – 200,00/400,00 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> кукурузный крахмал - 129,70/97,00 мг, натрия лаурилсульфат - 4,00/5,00 мг, повидон (поливинилпирролидон К 30) – 3,350/5,00 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,270/0,360 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0,030/0,040 мг, желатин - 3,70/5,480 мг, тальк очищенный - 6,70/12,00 мг, натрия карбоксиметилкрахмал - 3,350/5,20 мг, кремния диоксид коллоидный - 2,00/3,00 мг, магния стеарат - 2,00/3,00 мг. Оболочка: гипромеллоза - 2,40/6,640 мг, диоксид титана - 1,80/4,00 мг, тальк очищенный - 1,20/0 мг, натрия

Старая редакция	Новая редакция
очищенный тальк - 1,20/0 мг, пропиленгликоль - 0/2,00 мг, натрия лаурил сульфат - 0,10/0 мг, полиэтиленгликоль-400 - 0,500/0 мг.	лаурилсульфат - 0,10/0 мг, макрогол 400 - 0,500/0 мг, пропиленгликоль - 0/2,00 мг.
Форма выпуска Таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг, 400 мг. По 2 таблетки 200 мг в блистер из ПВХ/Ал.фольги. По 1 таблетке 400 мг в блистер из ПВХ/Ал.фольги. По 1 блистеру с инструкцией по применению в картонную пачку.	Форма выпуска Таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг, 400 мг. По 2 таблетки 200 мг в блистер из ПВХ/Ал.фольги. По 1 или 5 таблеток 400 мг в блистер из ПВХ/Ал.фольги. По 1 блистеру с инструкцией по применению в картонную пачку.

Менеджер по регистрации ЛС
компании Ипка Лабораториз Лимитед



Колмакова Н.Н.