МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003858-260821
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Грудной эликсир

Регистрационный номер:

Торговое наименование. Грудной эликсир.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Аммиак+Аниса обыкновенного плодов масло+Солодки корней экстракт.

Лекарственная форма. Раствор для приема внутрь.

Состав на 100 мл:

Активные компоненты:

Солодки корней экстракт (Солодки экстракт густой) с содержанием глицирризиновой кислоты 14 %	– 20,7 г
Аниса обыкновенного плодов масло (Анисовое масло)	– 0,34 г
Аммиак водный концентрированный 25 % эквивалентно 345 мг аммиака	– 1,38 г
Вспомогательные вещества:	
Этанол (спирт этиловый) 90 %	– 20,41 мл
Вода очищенная	– до 100 мл

Описание. Жидкость коричневого цвета с характерным запахом. Допускается в процессе хранения выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA10

Фармакологическое действие.

Отхаркивающий эффект грудного эликсира обусловлен действием входящих в него компонентов:

- солодки экстракт густой обладает противовоспалительным и отхаркивающим свойствами, которые связаны с содержанием в корнях глицирризина, стимулирующего активность реснитчатого эпителия в трахее и бронхах, а также усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
- анисовое масло обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анетола, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности реснитчатого эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов;
- аммиак обладает раздражающим действием, которое приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов верхних дыхательных путей и рефлекторной стимуляции центра дыхания.

Показания к применению.

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст, пациенты со склонностью к развитию лекарственной зависимости, эпилепсии.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

Внутрь, 3-4 раза в день. Взрослым – по 20-40 капель; детям назначают на прием столько капель, сколько ребенку лет. Перед применением препарат следует разводить в небольшом количестве воды.

Курс лечения - 7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях может наблюдаться диарея.

При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка.

При длительном применении с превышением указанных дозировок возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

При необходимости можно применять в сочетании с антибиотиками и другими лекарственными средствами. Не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания.

Содержание абсолютного этилового спирта в 1 капле препарата составляет 0,0075 г, в максимальной разовой дозе для взрослых – до 0,3 г, в максимальной суточной дозе – до 1,2 г.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска.

Раствор для приема внутрь.

По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы или флаконы-капельницы коричневого стекла со средствами укупорочными полимерными.

По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы, флаконы-капельницы, банки из полиэтилена высокого или низкого давления со средствами укупорочными.

По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные средствами укупорочными.

Каждый флакон, флакон-капельницу, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц, банок без пачки от 30 до 150 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров).

По 9, 18 кг в канистры из полиэтилена низкого давления с крышками и с инструкциями по применению (для стационаров).

По 9, 18 кг в бутыли стеклянные, укупоренные пробками притертыми или навинчиваемыми пластмассовыми крышками с прокладками (для стационаров).

Каждую бутыль по 9, 18 кг с инструкцией по применению помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения.

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности.

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932) 33-42-73, факс: (4932) 33-42-72, ivff37.ru

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932) 33-42-73, факс: (4932) 33-42-72, ivff37.ru

Генеральный директор
ОАО «Ивановская
фармацевтическая фабрика



В.Ю. Голубева