

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция


по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Амоксициллин Сандоз®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

0,5 г, 1,0 г

П N011270/01



Сандоз ГмбХ, Австрия

Изменение № 1

Срок введения изменений с « » **170414** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутрь. <u>Терапия инфекций:</u> Как правило, терапию рекомендуется продолжать в течение 2 - 3 дней после исчезновения симптомов заболевания. В случае инфекций, вызванных β-гемолитическим стрептококком, полная эрадикация патогена требует проведения терапии не менее 10 дней. Парентеральная терапия показана	Способ применения и дозы Внутрь. <u>Терапия инфекций:</u> Как правило, терапию рекомендуется продолжать в течение 2 - 3 дней после исчезновения симптомов заболевания. В случае инфекций, вызванных β-гемолитическим стрептококком, полная эрадикация патогена требует проведения терапии не менее 10 дней. Парентеральная терапия показана

Старая редакция	Новая редакция
при невозможности проведения пероральной и при лечении инфекций тяжелой степени.	при невозможности проведения пероральной и при лечении инфекций тяжелой степени.
<u>Взрослые дозировки (включая пациентов пожилого возраста):</u>	<u>Взрослые дозировки (включая пациентов пожилого возраста):</u>
<i>Стандартная доза:</i> Обычная доза колеблется от 750 мг до 3 г амоксициллина в день в несколько приемов. В некоторых случаях рекомендуется ограничиться дозой 1500 мг в сутки в несколько приемов.	<i>Стандартная доза:</i> Обычная доза колеблется от 750 мг до 3 г амоксициллина в день в несколько приемов. В некоторых случаях рекомендуется ограничиться дозой 1500 мг в сутки в несколько приемов.
<i>Короткий курс терапии:</i> Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: двукратный прием препарата по 3 г на каждое введение с интервалом между дозами 10 – 12 часов.	<i>Короткий курс терапии:</i> Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: двукратный прием препарата по 3 г на каждое введение с интервалом между дозами 10 – 12 часов.
<u>Детские дозировки (до 12 лет):</u> Суточная доза для детей составляет 25 – 50 мг/кг/сутки в несколько приемов (максимально 60 мг/кг/сутки) в зависимости от показания и тяжести заболевания. Дети с массой тела выше 40 кг должны получать взрослую дозировку.	<u>Детские дозировки (до 12 лет):</u> Суточная доза для детей составляет 25 – 50 мг/кг/сутки в несколько приемов (максимально 60 мг/кг/сутки) в зависимости от показания и тяжести заболевания. Дети с массой тела выше 40 кг должны получать взрослую дозировку.

Старая редакция	Новая редакция																								
<u>Дозирование при почечной недостаточности:</u> У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью доза должна быть снижена. При почечном клиренсе менее 30 мл/мин рекомендуется увеличение интервала между дозами или уменьшение последующих доз. При почечной недостаточности противопоказаны короткие курсы терапии по 3 г. <i>Взрослые (включая пациентов пожилого возраста):</i>	<u>Дозирование при почечной недостаточности:</u> У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью доза должна быть снижена. При почечном клиренсе менее 30 мл/мин рекомендуется увеличение интервала между дозами или уменьшение последующих доз. При почечной недостаточности противопоказаны короткие курсы терапии по 3 г. <i>Взрослые (включая пациентов пожилого возраста):</i>																								
<table><tr><th>Клиренс креатинина мл/мин</th><th>Доза</th><th>Интервал между приемом</th></tr><tr><td>> 30</td><td>Изменения дозы не требуются</td><td></td></tr><tr><td>10-30</td><td>500 мг</td><td>12 ч</td></tr><tr><td>< 10</td><td>500 мг</td><td>24 ч</td></tr></table>	Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом	> 30	Изменения дозы не требуются		10-30	500 мг	12 ч	< 10	500 мг	24 ч	<table><tr><th>Клиренс креатинина мл/мин</th><th>Доза</th><th>Интервал между приемом</th></tr><tr><td>> 30</td><td>Изменения дозы не требуются</td><td></td></tr><tr><td>10-30</td><td>500 мг</td><td>12 ч</td></tr><tr><td>< 10</td><td>500 мг</td><td>24 ч</td></tr></table>	Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом	> 30	Изменения дозы не требуются		10-30	500 мг	12 ч	< 10	500 мг	24 ч
Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом																							
> 30	Изменения дозы не требуются																								
10-30	500 мг	12 ч																							
< 10	500 мг	24 ч																							
Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом																							
> 30	Изменения дозы не требуются																								
10-30	500 мг	12 ч																							
< 10	500 мг	24 ч																							
При гемодиализе: 500 мг должны быть назначены после окончания процедуры.	При гемодиализе: 500 мг должны быть назначены после окончания процедуры.																								
<i>Нарушение функции почек у детей с массой тела менее 40 кг</i>	<i>Нарушение функции почек у детей с массой тела менее 40 кг</i>																								
<table><tr><th>Клиренс креатинина мл/мин</th><th>Доза</th><th>Интервал между приемом</th></tr><tr><td>> 30</td><td>Изменения дозы не требуются</td><td></td></tr><tr><td>10-30</td><td>15 мг/кг</td><td>12 ч</td></tr><tr><td>< 10</td><td>15 мг/кг</td><td>24 ч</td></tr></table>	Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом	> 30	Изменения дозы не требуются		10-30	15 мг/кг	12 ч	< 10	15 мг/кг	24 ч	<table><tr><th>Клиренс креатинина мл/мин</th><th>Доза</th><th>Интервал между приемом</th></tr><tr><td>> 30</td><td>Изменения дозы не требуются</td><td></td></tr><tr><td>10-30</td><td>15 мг/кг</td><td>12 ч</td></tr><tr><td>< 10</td><td>15 мг/кг</td><td>24 ч</td></tr></table>	Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом	> 30	Изменения дозы не требуются		10-30	15 мг/кг	12 ч	< 10	15 мг/кг	24 ч
Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом																							
> 30	Изменения дозы не требуются																								
10-30	15 мг/кг	12 ч																							
< 10	15 мг/кг	24 ч																							
Клиренс креатинина мл/мин	Доза	Интервал между приемом																							
> 30	Изменения дозы не требуются																								
10-30	15 мг/кг	12 ч																							
< 10	15 мг/кг	24 ч																							

Старая редакция	Новая редакция
<u>Профилактика эндокардита</u> Для профилактики эндокардита у пациентов, не находящихся под общим наркозом, следует назначать 3 г амоксициллина за 1 час перед операцией и при необходимости еще 3 г через 6 часов. Детям рекомендуется назначать амоксициллин в дозе 50 мг/кг. Для более детальной информации и описания категорий пациентов, входящих в группу риска по эндокардиту, следует обратиться к местным официальным руководствам.	<u>Профилактика эндокардита</u> Для профилактики эндокардита у пациентов, не находящихся под общим наркозом, следует назначать 3 г амоксициллина за 1 час перед операцией и при необходимости еще 3 г через 6 часов. Детям рекомендуется назначать амоксициллин в дозе 50 мг/кг. Для более детальной информации и описания категорий пациентов, входящих в группу риска по эндокардиту, следует обратиться к местным официальным руководствам.

Руководитель отдела регистрации



 Б. Мравинец