



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Упсарин Упса®

торговое наименование лекарственного препарата

Таблетки шипучие, 500 мг

лекарственная форма, дозировка

УПСА САС, Франция

наименование производителя, страна

Изменение № 6

22 06 21

Дата внесения Изменения «__» _____ 202__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания - детский возраст до 15 лет; - гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим НПВП и компонентам препарата; - дефицит глюкозо-б-фосфатдегидрогеназы, фенилкетонурия (препарат содержит аспартам); - бронхиальная астма, индуцированная приемом	Противопоказания - детский возраст до 15 лет; - гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим НПВП и компонентам препарата; - дефицит глюкозо-б-фосфатдегидрогеназы, фенилкетонурия (препарат содержит аспартам); - бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и др. НПВП в анамнезе;

Старая редакция	Новая редакция
салицилатов и др. НПВП в анамнезе; беременность (I и III триместр), период грудного вскармливания; - эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения), желудочно-кишечное кровотечение; - геморрагические диатезы (гемофилии, болезнь Виллебранда, телеангиоэктазии, гипопротромбинемия, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура); - выраженные нарушения функции печени или почек; - дефицит витамина К; - глюкозо-галактозная мальабсорбция; - одновременный прием с метотрексатом в дозе 15 мг/нед и более (смотри раздел: «Взаимодействие»); - одновременный прием пероральных антикоагулянтов и ацетилсалициловой кислоты в дозе,	- беременность, период грудного вскармливания; - эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения), желудочно-кишечное кровотечение; - геморрагические диатезы (гемофилии, болезнь Виллебранда, телеангиоэктазии, гипопротромбинемия, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура); - выраженные нарушения функции печени или почек; - дефицит витамина К; - глюкозо-галактозная мальабсорбция; - одновременный прием с метотрексатом в дозе 15 мг/нед и более (смотри раздел: «Взаимодействие»); - одновременный прием пероральных антикоагулянтов и ацетилсалициловой кислоты в дозе, превышающей 3 г в день (смотри раздел: «Взаимодействие»).

Старая редакция	Новая редакция
превышающей 3 г в день (смотри раздел: «Взаимодействие»). <i>Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.</i> С осторожностью - гиперурикемия, уратный нефролитиаз, подагра, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечные кровотечения (в анамнезе), почечная и печеночная недостаточность, бронхиальная астма, полипоз носа, лекарственная аллергия, беременность(II триместр), одновременный прием антикоагулянтов и ацетилсалициловой кислоты в дозе менее 3 г в день, одновременный прием ацетилсалициловой кислоты и метотрексата в дозе менее 15 мг/день, метроррагия (ациклическое маточные кровотечения), гиперменорея	<i>Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.</i> С осторожностью - гиперурикемия, уратный нефролитиаз, подагра, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечные кровотечения (в анамнезе), почечная и печеночная недостаточность, бронхиальная астма, полипоз носа, лекарственная аллергия, одновременный прием антикоагулянтов и ацетилсалициловой кислоты в дозе менее 3 г в день, одновременный прием ацетилсалициловой кислоты и метотрексата в дозе менее 15 мг/день, метроррагия (ациклические маточные кровотечения), гиперменорея (обильные и продолжительные менструации). <i>Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.</i>

Старая редакция	Новая редакция
(обильные и продолжительные менструации). Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат Упсарин Упса® противопоказан в I и III триместре беременности. Применение во II триместре беременности — с осторожностью, только если потенциальная польза применения превышает потенциальный риск для плода. Кормить грудью при применении препарата не рекомендуется.	Применение при беременности и в период грудного вскармливания <i>Беременность</i> Применение больших доз салицилатов в I триместре беременности ассоциируется с повышенной частотой дефектов развития плода (расщепленное нёбо, пороки сердца). При применении НПВП у женщин с 20-й недели беременности возможно развитие маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция). Применение препарата во время беременности противопоказано. <i>Период грудного вскармливания</i> Салицилаты и их метаболиты в небольших количествах проникают в грудное молоко. Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

Менеджер по регистрации
ООО «Дельта Медикел»



Э.В. Воргунова