МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЕСПЕРИДИН + ДИОСМИН

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 900 мг

АО «АЛИУМ», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 041021 20___ г

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование Неопракт Табс	**Торговое наименование** ГЕСПЕРИДИН + ДИОСМИН
Фармакологические свойства ***Фармакодинамика*** Неопракт Табс оказывает ангиопротекторное и венотонизирующее действие. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой; снижает проницаемость, ломкость капилляров и увеличивает их резистентность; улучшает микроциркуляцию и лимфоотток. При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы. Оптимальное соотношение «доза-эффект» наблюдается при приеме 1000 мг в день. ***Фармакокинетика*** Основное выделение препарата	**Фармакологические свойства** ***Фармакодинамика*** Препарат оказывает ангиопротекторное и венотонизирующее действие. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой; снижает проницаемость, ломкость капилляров и увеличивает их резистентность; улучшает микроциркуляцию и лимфоотток. При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы. Оптимальное соотношение «доза – эффект» наблюдается при приеме 1000 мг в день. ***Фармакокинетика*** Основное выделение препарата

происходит через кишечник. Через почки в среднем выводится около 14 % принятого количества препарата. Период полувыведения составляет 11 часов. Препарат Неопракт Табс подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием феноловых кислот в моче.	происходит через кишечник. Через почки в среднем выводится около 14 % принятого количества препарата. Период полувыведения составляет 11 часов. Препарат подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием феноловых кислот в моче.
Показания к применению Неопракт Табс показан для терапии симптомов хронических заболеваний вен (устранения и облегчения симптомов). Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности: - судороги нижних конечностей; - ощущение тяжести и распирания в ногах; - боль; - «усталость» ног. Терапия проявлений венозно-лимфатической недостаточности: - отеки нижних конечностей; - трофические изменения кожи и подкожной клетчатки; - венозные трофические язвы. Симптоматическая терапия острого и хронического геморроя.	**Показания к применению** Препарат показан для терапии симптомов хронических заболеваний вен (устранения и облегчения симптомов). Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности: - судороги нижних конечностей; - ощущение тяжести и распирания в ногах; - боль; - усталость ног. Терапия проявлений венозно-лимфатической недостаточности: - отеки нижних конечностей; - трофические изменения кожи и подкожной клетчатки; - венозные трофические язвы. Симптоматическая терапия острого и хронического геморроя.
Противопоказания Повышенная чувствительность к действующим веществам или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. Не рекомендуется прием препарата женщинам в период грудного вскармливания.	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к действующим веществам или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. Беременность и период грудного вскармливания (опыт применения

	ограничен или отсутствует). Детский возраст до 18 лет (опыт применения отсутствует).
Передозировка Случаев передозировки не описано. *При передозировке препарата немедленно обратитесь за медицинской помощью.*	**Передозировка** *Симптомы* Данные о случаях передозировки препарата ограничены. Наиболее частыми нежелательными реакциями в случаях передозировки были желудочно-кишечные нарушения (диарея, тошнота, боль в животе) и кожные реакции (зуд, сыпь). *Лечение* Помощь при передозировке должна заключаться в устранении клинических симптомов. При передозировке препарата необходимо немедленно обратиться к врачу.
Особые указания Перед тем как начать принимать препарат Неопракт Табс, рекомендуется проконсультироваться с врачом. При обострении геморроя назначение препарата Неопракт Табс не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки, указанные в разделе «Способ применения и дозы». В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует пройти осмотр у проктолога, который подберет дальнейшую терапию. При наличии нарушений венозного	**Особые указания** Перед тем как начать принимать препарат, рекомендуется проконсультироваться с врачом. При обострении геморроя назначение препарата не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки, указанные в разделе «Способ применения и дозы». В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует пройти осмотр у проктолога, который подберет дальнейшую терапию. При наличии нарушений венозного

кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии со здоровым (сбалансированным) образом жизни: желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также рекомендуется снижение избыточной массы тела. Пешие прогулки и, в некоторых случаях, ношение специальных чулок, способствует улучшению циркуляции крови. Незамедлительно обратитесь к врачу, если в процессе лечения ваше состояние ухудшилось или улучшения не наступило. **Производитель** АО «АЛИУМ», Российская Федерация. Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал Б, д. 34; Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2. *Выпускающий контроль качества* Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2, стр. 1	кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии со здоровым (сбалансированным) образом жизни: желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также рекомендуется снижение избыточной массы тела. Пешие прогулки и в некоторых случаях ношение специальных чулок способствует улучшению циркуляции крови. Незамедлительно обратитесь к врачу, если в процессе лечения ваше состояние ухудшилось или улучшения не наступило. **Производитель** АО «АЛИУМ», Россия. Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2. *Выпускающий контроль качества* Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2, стр. 1.

Директор по регуляторике и исследованиям **Г. У. Сетдекова**

Акционерное общество "Биннофарм" Для документов Москва