ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Граммидин® нео

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Граммидин® нео
Международное непатентованное или группировочное название:
грамицидин С + цетилпиридиния хлорид
Лекарственная форма: таблетки для рассасывания
Состав:
1 таблетка содержит:
активные вещества:
грамицидина С дигидрохлорида (в пересчете на грамицидин С) – 0,003 г
цетилпиридиния хлорида моногидрата (в пересчете на цетилпиридиния хлорид) – 0,001 г
вспомогательные вещества:
кремния диоксид коллоидный (Аэросил® 200), тальк, ацесульфам калия, ароматизатор мятный, сорбитол (Neosorb®), магния стеарат.
Описание: таблетки белого цвета круглые двояковыпуклые с надписью на одной стороне GR.
Фармакотерапевтическая группа: антибиотик + антисептическое средство
Код АТХ: [R02A]

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.
Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.
Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.
Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.
Препарат уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.
Фармакокинетика
Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

Показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, гингивит, стоматит.

Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- детский возраст до 4 лет;
- беременность (I триместр).

Применение при беременности и в период лактации
Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр.
Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Способ применения и дозы
Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая.
Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.
Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3 - 4 раза в день.
Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.
При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Побочное действие
В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Граммидин® нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Форма выпуска:
Таблетки для рассасывания.
По 6 или 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки по 6 таблеток или 2 контурные ячейковые упаковки по 9 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения:
В сухом месте при температуре не выше 25° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:
2 года. Не применять после истечения срока годности
Условия отпуска из аптек:
Без рецепта.
Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:
ОАО «Валента Фармацевтика»,
141101, г. Щелково, Московская область, ул.Фабричная,2.
Тел. (495)933-48-62, факс (495)933-48-63

И.О. Директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Генеральный директор ОАО
«Валента Фармацевтика» С.А. Окуньков