


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Талс™ (TALTZ®)
торговое наименование лекарственного препарата

раствор для подкожного введения, 80 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

Эли Лилли энд Компани, США
наименование производителя, страна



Изменение №1


Дата внесения Изменения « 15 04 22 » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование Талс™	Торговое наименование Талс® <i>Примечание: торговое наименование лекарственного препарата изменено по всему тексту инструкции по медицинскому применению и руководства по использованию автоинъектора с указанием знака зарегистрированной торговой марки.</i>

Руководство по использованию автоинъектора Талс™ Иксекизумаб Раствор для подкожного введения 80 мг/мл В автоинъекторе для однократного применения ... 1. ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ПРЕПАРАТА 1) Достаньте автоинъектор из холодильника. Не снимайте колпачок основания до момента введения препарата. Оставьте автоинъектор при комнатной температуре примерно на 30 мин. Этот шаг обеспечит более комфортное введение препарата в дальнейшем. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие источники тепла (микроволновая печь, горячая вода, прямые солнечные лучи). 2) Подготовьте спиртовую салфетку и ватный тампон (или марлевую салфетку).  3) Осмотрите автоинъектор. Проверьте маркировку. Убедитесь, что на этикетке указано наименование препарата «Талс™», а также, что не истек срок годности препарата. Раствор препарата должен быть прозрачным. Цвет раствора может варьироваться от бесцветного до слегка желтого. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автоинъектор, если: • истек срок годности препарата. • на нем имеются какие-либо повреждения.	Руководство по использованию автоинъектора Талс® Иксекизумаб Раствор для подкожного введения 80 мг/мл В автоинъекторе для однократного применения ... 1. ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ПРЕПАРАТА 1) Достаньте автоинъектор из холодильника. Не снимайте колпачок основания до момента введения препарата. Оставьте автоинъектор при комнатной температуре примерно на 30 мин. Этот шаг обеспечит более комфортное введение препарата в дальнейшем. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие источники тепла (микроволновая печь, горячая вода, прямые солнечные лучи). 2) Подготовьте спиртовую салфетку и ватный тампон (или марлевую салфетку).  3) Осмотрите автоинъектор. Проверьте маркировку. Убедитесь, что на этикетке указано наименование препарата «Талс®», а также, что не истек срок годности препарата. Раствор препарата должен быть прозрачным. Цвет раствора может варьироваться от бесцветного до слегка желтого. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автоинъектор, если: • истек срок годности препарата. • на нем имеются какие-либо повреждения.
---	---

- препарат мутный, коричневого цвета или содержит мелкие частицы.

4) **Вымойте руки перед проведением инъекции.**



5) **Выберите место для введения препарата.**

Вы можете вводить препарат в область живота, бедра или плеча. Для инъекции в область плеча Вам потребуется помощь другого человека.

НЕ ВЫБИРАЙТЕ места повышенной чувствительности, области, где имеются синяки, покраснения или уплотнения, или те области, где имеются рубцы или растяжки. **НЕ** вводите препарат в радиусе 2,5 сантиметров от пупка.


Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом относительно мест инъекции, которые подходят Вам наилучшим образом.

Меняйте (чередуйте) места инъекций. НЕ ВВОДИТЕ препарат каждый раз в одно и то же место. Например, если последний раз инъекция была сделана в левое бедро, в следующий раз инъекцию следует сделать в правое бедро, живот или заднюю часть плеча любой руки.

6) **Подготовьте место инъекции.** Обработайте место инъекции спиртовой салфеткой, дайте высохнуть.

- препарат мутный, коричневого цвета или содержит мелкие частицы.

4) **Вымойте руки перед проведением инъекции.**



5) **Выберите место для введения препарата.**

Вы можете вводить препарат в область живота, бедра или плеча. Для инъекции в область плеча Вам потребуется помощь другого человека.

НЕ ВЫБИРАЙТЕ места повышенной чувствительности, области, где имеются синяки, покраснения или уплотнения, или те области, где имеются рубцы или растяжки. **НЕ** вводите препарат в радиусе 2,5 сантиметров от пупка.

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом относительно мест инъекции, которые подходят Вам наилучшим образом.

Меняйте (чередуйте) места инъекций. НЕ ВВОДИТЕ препарат каждый раз в одно и то же место. Например, если последний раз инъекция была сделана в левое бедро, в следующий раз инъекцию следует сделать в правое бедро, живот или заднюю часть плеча любой руки.

6) **Подготовьте место инъекции.** Обработайте место инъекции спиртовой салфеткой, дайте высохнуть.

Старший менеджер по регистрации

Представительство АО «Эли Лилли Восток С.А.»

Курбанова Е.К.

