



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Магния сульфат

(торговое наименование лекарственного препарата)

раствор для внутривенного введения, 250 мг/мл

(лекарственная форма, дозировка)

**Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»
(ОАО «БЗМП»), Республика Беларусь**

(наименование производителя, страна)

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «120320» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного введения.	Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения.
Способ применения и дозы Внутримышечно и внутривенно (струйно медленно или капельно). Пациент должен находиться в положении лёжа. Дозы уточняют с учетом терапевтического эффекта и содержания ионов магния в сыворотке крови. <i>При гипертонических кризах</i> вводят внутривенно (медленно в течение около 5 минут!!) 5-20 мл раствора магния сульфата 250 мг/мл. <i>Для купирования аритмии</i> внутривенно вводят 1-2 г (4-8 мл препарата) в течение около 5 минут, возможно повторное введение. <i>Презеклампсия и эклампсия.</i> Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от	Способ применения и дозы Внутривенно (струйно медленно или капельно). Пациент должен находиться в положении лёжа. Дозы уточняют с учетом терапевтического эффекта и содержания ионов магния в сыворотке крови. <i>При гипертонических кризах</i> вводят внутривенно (медленно в течение около 5 минут!!) 5-20 мл раствора магния сульфата 250 мг/мл. <i>Для купирования аритмии</i> внутривенно вводят 1-2 г (4-8 мл препарата) в течение около 5 минут, возможно повторное введение. <i>Презеклампсия и эклампсия.</i> Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от

клинической ситуации. Доза насыщения - 2-4 г (8-16 мл препарата) через 5-20 мин (инфузия). Поддерживающая доза - 1-2 г (4-8 мл препарата) в час.

Тетания матки. Доза насыщения - 4 г (16 мл препарата) через 20 мин (инфузия). Поддерживающая доза - сначала 1-2 г (4-8 мл препарата) в час, позже - 1 г (4 мл препарата) в час (можно вводить капельно 24-72 ч).

Гипомагниемия.

У новорожденных. Суточная доза - 0,2-0,8 мг/кг внутримышечно или внутривенно медленно.

У взрослых. Лёгкая. Раствор магния сульфата применяют парентерально, если невозможен или нецелесообразен пероральный путь введения препаратов магния (из-за тошноты, рвоты, нарушенного всасывания в желудке и др.). Суточная доза - 1-2 г (4-8 мл препарата). Эту дозу вводят однократно или в 2-3 приема.

У взрослых. Тяжёлая. Начальная доза - 5 г (20 мл препарата). Дозу в 1 л инфузионного раствора (0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы (глюкозы)). Дозируют в зависимости от содержания ионов магния в сыворотке крови. При длительном применении рекомендуется мониторинг артериального давления, деятельности сердца, сухожильных рефлексов, деятельности почек, частоты дыхания. При необходимости одновременного введения солей кальция и магния, препараты следует вводить в разные вены.

клинической ситуации. Доза насыщения - 2-4 г (8-16 мл препарата) через 5-20 мин (инфузия). Поддерживающая доза - 1-2 г (4-8 мл препарата) в час.

Тетания матки. Доза насыщения - 4 г (16 мл препарата) через 20 мин (инфузия). Поддерживающая доза - сначала 1-2 г (4-8 мл препарата) в час, позже - 1 г (4 мл препарата) в час (можно вводить капельно 24-72 ч).

Гипомагниемия.

У новорожденных. Суточная доза - 0,2-0,8 мг/кг внутривенно медленно.

У взрослых. Лёгкая. Раствор магния сульфата применяют парентерально, если невозможен или нецелесообразен пероральный путь введения препаратов магния (из-за тошноты, рвоты, нарушенного всасывания в желудке и др.). Суточная доза - 1-2 г (4-8 мл препарата). Эту дозу вводят однократно или в 2-3 приема.

У взрослых. Тяжёлая. Начальная доза - 5 г (20 мл препарата). Дозу в 1 л инфузионного раствора (0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы (глюкозы)). Дозируют в зависимости от содержания ионов магния в сыворотке крови. При длительном применении рекомендуется мониторинг артериального давления, деятельности сердца, сухожильных рефлексов, деятельности почек, частоты дыхания. При необходимости одновременного введения солей кальция и магния, препараты следует вводить в разные вены.

Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл. 5 мл в ампулы из стекла. 10 ампул вместе с ножом или скарификатором для вскрытия ампул и инструкцией по медицинскому применению помещают в коробку из картона с гофрированным вкладышем из бумаги. Коробку оклеивают этикеткой-бандеролью. 10 ампул вместе с ножом или скарификатором для вскрытия ампул и инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона с одним или двумя вкладышами для фиксации ампул из картона. Пачки упаковывают в групповую упаковку. В случае использования ампул с кольцом излома или с насечкой и точкой излома, вложение ножа для вскрытия ампул не предусматривается.	Форма выпуска Раствор для внутривенного введения 250 мг/мл. По 5 мл препарата в ампулы из стекла. 10 ампул вместе с ножом или скарификатором для вскрытия ампул и инструкцией по медицинскому применению помещают в коробку из картона с гофрированным вкладышем из бумаги. Коробку оклеивают этикеткой-бандеролью из бумаги. 10 ампул вместе с ножом или скарификатором для вскрытия ампул и инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона с одним или двумя вкладышами для фиксации ампул из картона. Коробки и пачки упаковывают в групповую упаковку. В случае использования ампул с кольцом излома или с насечкой и точкой излома, вложение ножа или скарификатора для вскрытия ампул не предусматривается.
--	---

Генеральный директор

открытого акционерного общества

«Борисовский завод медицинских препаратов»



Е.А. Тарасенко