

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Комфодерм® М₂**

крем для наружного применения 0,1 % + 2 %

Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН"
(АО "АКРИХИН"), Россия

Изменение № 3

Дата внесения изменения " ____ " 20 ____ г.

311019

Старая редакция	Новая редакция
Состав 100 г крема содержат: <i>активные вещества:</i> метилпреднизолона ацепонат в пересчете на 100 % вещество – 0,1 г, мочевины в пересчете на 100 % вещество – 2 г; <i>вспомогательные вещества:</i> парафин жидкий (вазелиновое масло) – 15 г, пропиленгликоль – 5 г, полисорбат-80 – 1 г, карбомер интерполимер (тип А) – 1 г, триметамол – 0,4 г, метилпарагидроксибензоат – 0,1 г, вода очищенная – до 100 г.	Состав 100 г крема содержат: <i>действующие вещества:</i> метилпреднизолона ацепонат (метилпреднизолона ацепонат микронизированный) в пересчете на 100 % вещество – 0,1 г, мочевины в пересчете на 100 % вещество – 2 г; <i>вспомогательные вещества:</i> парафин жидкий (вазелиновое масло), пропиленгликоль, полисорбат-80, карбомер интерполимер (тип А), триметамол, метилпарагидроксибен-

	зоат, вода очищенная.
Форма выпуска Крем для наружного применения 0,1% + 2 %. По 10 или 30 г в тубу алюминиевую. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Крем для наружного применения 0,1% + 2 %. По 10 или 30 г в тубу алюминиевую с бушонами из полимерных матери- алов. Каждую тубу вместе с ин- струкцией по применению помеща- ют в пачку из картона.

Представитель фирмы



Е. В. Новикова