

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

УРОДЕРМ

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Уродерм.**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Мочевина.**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения**Состав:****Действующее вещество:** мочевина (карбамид) (в пересчете на 100 %) – 0,300 г.**Вспомогательные вещества:** воск эмульсионный – 0,060 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) – 0,060 г, глицерол (глицерин) (в пересчете на 100 %) – 0,100 г, глицин (кислота аминорусная) – 0,002 г, этанол (спирт этиловый) 95 % – 0,100 г, вода очищенная до 1,0 г.**Описание.** Однородная мазь белого цвета, возможен слабый запах аммиака.**Фармакотерапевтическая группа:** кератолитическое средство.**Код АТХ** D11AX**Фармакологические свойства**

Обладает кератолитическим действием, смягчает и увлажняет кожу, повышает ее эластичность.

Показания к применению

В комплексной терапии заболеваний кожи, сопровождающихся избыточным ороговением: ихтиоз и ихтиозиформные дерматозы, кератодермии, псориаз, хроническая экзема, болезнь Девержи, фолликулярный кератоз, гиперкератотические формы грибковых заболеваний; оомозелости, сухость кожи.

Используется для размягчения кожи и удаления роговых наслоений при бородавках (перед удалением) и для размягчения ногтевых пластинок в целях облегчения их подрезания и обработки при вросшем ногте, ониомикозах, ониогрифозе, ониходистрофии, твердых ногтях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует наносить на обширные поверхности при почечной, печеночной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо соблюдать осторожность, использовать только по рекомендации врача. Не следует наносить препарат на обширные поверхности.

Способ применения и дозы

Наружно. При заболеваниях кожи, сопровождающихся избыточным ороговением (ихтиозе, ихтиозиформных дерматозах, кератодермиях, псориазе, хронической экземе, болезни Девержи, фолликулярном кератозе, оомозелелостях, сухости кожи), мазь наносят на участки скопления роговых наслоений тонким слоем 2 раза в день. При сильном шелушении возможно использование окклюзионной повязки. Перед нанесением мази поверхностные раны, эрозии, трещины, корочки, ссадины обрабатывают антисептиками. Лечение прекращают после устранения роговых наслоений.

При гиперкератотических формах грибковых заболеваний мазь наносят за 20–30 минут до противогрибковых наружных средств.

При бородавках мазь наносят на 2–8 часов под лейкопластырь, затем размягченную часть бородавки срезают, после чего возможно ее удаление.

Для облегчения подрезания и обработки ногтей при вросшем ногте, онихомикозах, онихогрифозе, ониходистрофии, твердых ногтях мазь наносят на ногти на 20–30 минут, затем их подрезают. При значительном утолщении ногтей мазь наносят 2 раза в день, заклеивая лейкопластырем, обрабатывают после размягчения.

Длительность лечения при кожных заболеваниях зависит от локализации и тяжести процесса и может составлять несколько недель. Для облегчения подрезания и обработки ногтей мазь может использоваться 2–3 раза в месяц, длительность использования ее в таких случаях не ограничена.

Побочное действие

При использовании в остром периоде кожного заболевания в отдельных случаях возможно усиление зуда и покраснения кожи в местах нанесения препарата, что требует его временной отмены до снижения остроты процесса. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Способность мочевины разрыхлять роговой слой кожи создает условия для повышения резорбции других наружных средств, что усиливает их действие. Мазь можно чередовать (утро–вечер) с любыми другими наружными средствами, кроме кератолитических (мазь салициловая).

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 30 %.

По 10, 15, 20, 35 г в тубу алюминиевую.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Замораживания не допускать.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/

Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Ретиноиды»,

111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр.5

Тел./факс: (495) 684-2187, 234-6118, 234-6119

www.retinoids.ru

Адрес места производства: 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5

Директор ЗАО «Ретиноиды»



К.В. Ноздрин