

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА РАСТВОР В ГЛИЦЕРИНЕ

Регистрационный номер:

Торговое название: Натрия тетрабората раствор в глицерине

Международное непатентованное название: натрия тетраборат

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения

Состав:

Активное вещество: натрия тетрабората декагидрат – 20 г

Вспомогательное вещество: глицерол – 80 г

Описание: бесцветная вязкая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: [D08AD]

Фармакологическое действие

Антисептическое средство. Обладает бактериостатической активностью. Эффективен при кандидозе. Удаляет мицелий гриба со слизистых оболочек.

Фармакокинетика

Абсорбция низкая; может всасываться через поврежденные кожные покровы.

Показания к применению

Кандидозные поражения слизистой оболочки полости рта, глотки, верхних дыхательных путей, наружных половых органов; опрелости, пролежни.

Противопоказания

Гиперчувствительность, значительные повреждения целостности кожных покровов (при обработке кожи); детский возраст; беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Наружно - для полосканий и смазывания кожи 2-3 раза в день.

Местно – для спринцеваний и смазывания слизистой оболочки полости рта. Смазывают пораженные участки слизистой оболочки полости рта 2-3 раза в день. Курс лечения составляет 3-7 дней. При лечении вагинального кандидоза (молочницы) перед применением препарата необходимо провести спринцевание кипяченой водой или раствором ромашки, после чего тампон, смоченный в препарате, вводят во влагалище на 20-30 минут. Частота

применения и курс лечения зависят от тяжести заболевания. При незначительных выделениях и зуде препарат применяют один раз в день лучше на ночь, а при обильных выделениях препарат применяют 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней.

Побочное действие

Слабое цитотоксическое, судорожное, местнораздражающее действие; гиперемия, ощущение жжения в месте нанесения препарата.

Передозировка

Передозировка возможна при случайном приеме препарата внутрь.

Симптомы: боль в животе, рвота, снижение аппетита, диарея, дегидратация, слабость, спутанность сознания, дерматиты, нарушение менструального цикла, анемия, подергивание мышц лица и конечностей, алоpecia, нарушение функции сердца, печени, почек. Смертельная доза для взрослых – 10 - 20 г, токсическая концентрация в крови – 40 мг/л, смертельная – 50 мг/л.

Лечение: промывание желудка, форсированный диурез, при тяжелом отравлении – гемодиализ, в/м - рибофлавин-моноклеотид 10 мг/сут, коррекция водно-электролитного баланса и ацидоз: в/в инфузия раствора натрия гидрокарбоната, плазмозамещающие растворы, раствор натрия хлорида и декстрозы. При болях в животе - п/к 1 мл 0,1 % раствора атропина, 1 мл 0,2 % раствора платифиллина, 1 мл 1 % раствора промедола, в/в - декстрозо-прокаиновая смесь (50 мл 2 % раствора прокаина и 500 мл 5 % раствора декстрозы).

Поддержание функций ССС.

Особые указания

При монотерапии вагинального кандидоза с целью повышения эффективности необходимо, чтобы лечебные процедуры проводились медицинским персоналом многократно; в противном случае мицелий гриба может задерживаться в криптах слизистой оболочки влагалища, что приведет к рецидиву заболевания.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 20 %.

По 30 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Допускается упаковка флаконов с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73

Директор ООО «Тульская
фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович