МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-002895 160919
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Микодерил®
раствор для наружного применения, 1 %

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 160919 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 мл: *Активное вещество*: нафтифина гидрохлорид – 10,0 мг. *Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль – 50,0 мг, этанол (этиловый спирт 95 %) – 400,0 мг, вода очищенная – до 1 мл. **Форма выпуска** Раствор для наружного применения, 1 %. По 10 мл, 20 мл во флаконы-капельницы из темного (янтарного) стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами и полиэтиленовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	**Состав на 1 мл:** *Действующее вещество*: нафтифина гидрохлорид - 10,0 мг. *Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль - 50,0 мг, этанол (этиловый спирт 95 %) - 400,0 мг, вода очищенная - до 1 мл. **Форма выпуска** Раствор для наружного применения, 1 %. По 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 30 мл во флаконы-капельницы из темного (янтарного) стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами и полиэтиленовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель
АО "Отисифарм" Е.В. Толстова

ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Для документов ОТСРНАВИ ОТИСИФАРМ

119448