

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
ВИНИЛИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: винилин.

Международное непатентованное или группировочное наименование: поливинокс.

Лекарственная форма: бальзам.

Состав: действующие вещества: поливинокс (винилин) - 50 г или 100 г.

Описание

Густая вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает антисептическое действие, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.

Фармакокинетика

Нет сведений.

Показания к применению

Фурункулез, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги, обморожения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к поливиноксу. Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Нет сведений.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не изучалось.

Форма выпуска

Бальзам.

По 50 и 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми, или типа «Топаз», или по 100 г во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом, или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми, или по 50 г и 100 г во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными, или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) (по 50 шт.) с равным количеством инструкций по применению.

На флаконы, пачки наклеивают этикетки из бумаги, или самоклеющуюся этикетку.

Условия хранения

В хорошо укупоренной таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

ОАО «Самарамедпром», 443070, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.
Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.


Производитель

ОАО «Самарамедпром», 446100, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 99-Б.
ОАО «Самарамедпром», 443546, РФ, Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра-
Дубрава, на территории завода «Коммунар», лит. Б, Б1, здание №2.

Генеральный директор
ОАО «Самарамедпром»



Найденов К.А.



106162