

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Винилин

наименование лекарственного препарата

Бальзам

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Самарамедпром», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « » 23 06 22 20 г.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ВИНИЛИН	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Винилин
Торговое название препарата: винилин.	Торговое наименование препарата: Винилин.
Лекарственная форма: бальзам.	Лекарственная форма: жидкость для при- ема внутрь и наружного применения.
Состав: <i>действующие вещества:</i> поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г.	Состав: <i>действующее вещество:</i> поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г.
Фармакодинамика Оказывает антисептическое действие, спо- собствует очищению ран, регенерации тка- ней и эпителизации.	Фармакодинамика Оказывает антисептическое действие, спо- собствует очищению ран, регенерации тка- ней и эпителизации. При приеме внутрь действует как обвола- кивающее, противовоспалительное и бакте- риостатическое средство.

145337


СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Показания к применению Фурункулез, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги, обморожения. Противопоказания Повышенная чувствительность к поливинуксу. Детский возраст до 18 лет. Способ применения и дозы Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания. Если после лечения улучшения не наступит или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.	Показания к применению <i>Наружно:</i> фурункулез, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги, обморожения. <i>Внутрь:</i> в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка. Противопоказания Повышенная чувствительность к поливинуксу, заболевания печени, желчного пузыря и почек, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания. Способ применения и дозы <i>Наружно:</i> для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания. <i>Внутрь:</i> 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч); при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке; курс – 16-20 дней; при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-12 дней.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Форма выпуска Бальзам. По 50 и 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми, или типа «Топаз», или по 100 г во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом, или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми, или по 50 г и 100 г во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными, или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) (по 50 шт.) с равным количеством инструкций по применению. На флаконы, пачки наклеивают этикетки из бумаги, или самоклеющуюся этикетку.	Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Форма выпуска Жидкость для приема внутрь и наружного применения. По 50 и 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными, или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми или типа «Топаз», или по 100 г во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми, или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми, или по 50 г и 100 г во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными. По 50, 100 г в тубы ламинатные с бушонами или в тубы алюминиевые с бушонами. Каждый флакон, тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка флаконов, туб в групповую упаковку (коробку картонную) с

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Условия хранения В хорошо укупоренной таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Владелец регистрационного удостоверения ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д.70 Организация, принимающая претензии ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846)373-81-08 Адрес места производства Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б. Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание № 2.	равным количеством инструкций по применению. Допускается наносить текст инструкции на пачку. На флаконы, тубы, пачки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку. Допускается нанесение маркировки непосредственно на тубу. Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель ОАО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б. ОАО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание № 2. Владелец регистрационного удостоверения ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70. Организация, принимающая претензии ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Генеральный директор

ООО «Женел РД»



А.Д. Воинова
145337