

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Лазолван® Рино

наименование лекарственного препарата

спрей назальный дозированный, 82 мкг/доза

лекарственная форма, дозировка

Институт де Ангели С.Р.Л., Италия

наименование фирмы-производителя, страна

Изменение № 3


Дата внесения Изменения « » 290517 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав в 1 дозе спрея содержится: Активное вещество: трамазолина гидрохлорида моногидрат в пересчете на трамазолина гидрохлорид 82 мкг. Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат 270 мкг, натрия гидроксид 154 мкг, бензалкония хлорид 14 мкг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 35 мкг, повидон 2101 мкг, глицерол 85% 700 мкг, магния сульфата гептагидрат 49 мкг, магния хлорида гексагидрат 35 мкг, кальция хлорида дигидрат 11 мкг, натрия гидрокарбонат 1 мкг, натрия хлорид 183 мкг, цинеол (эвкалиптол) 7 мкг, L-ментол (левоментол) 14 мкг, камфора рацемическая 14 мкг, вода очищенная 66358 мкг.	Состав в 1 дозе спрея содержится: <i>Действующее вещество:</i> трамазолина гидрохлорида моногидрат в пересчете на трамазолина гидрохлорид 82 мкг. <i>Вспомогательные вещества:</i> лимонной кислоты моногидрат 270 мкг, натрия гидроксид 154 мкг, бензалкония хлорид 14 мкг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 35 мкг, повидон 2101 мкг, глицерол 85% 700 мкг, магния сульфата гептагидрат 49 мкг, магния хлорида гексагидрат 35 мкг, кальция хлорида дигидрат 11 мкг, натрия гидрокарбонат 1 мкг, натрия хлорид 183 мкг, цинеол (эвкалиптол) 7 мкг, L-ментол (левоментол) 14 мкг, камфора рацемическая

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Отек слизистой оболочки носа, заложенность носа, вызванные острыми респираторными заболеваниями и/или поллинозом (ринит, сенная лихорадка). При синусите и среднем отите (евстахеите), для облегчения оттока содержимого придаточных пазух носа, по рекомендации врача. С осторожностью Пациентам с артериальной гипертензией, заболеваниями сердца, гипертиреозом, гипертрофией предстательной железы, феохромоцитомой, порфирией следует применять Лазолван® Рино только по рекомендации врача в связи с наличием потенциального риска системной абсорбции препарата. Следует соблюдать осторожность при приеме ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов, вазопрессорных препаратов и антигипертензивных препаратов. Беременность и период лактации Длительный опыт применения показывает, что Лазолван® Рино не оказывает негативного влияния на беременность. Безопасность применения препарата в период лактации не подтверждена. Лазолван® Рино не должен применяться во время первого триместра беременности. На	14 мкг, вода очищенная 66358 мкг. Показания к применению Отек слизистой оболочки носа, заложенность носа, вызванные острыми респираторными заболеваниями и/или поллинозом (ринит, сенная лихорадка); синусит и средний отит (евстахиит) для облегчения оттока содержимого придаточных пазух носа, по рекомендации врача. С осторожностью Пациентам с артериальной гипертензией, заболеваниями сердца, гипертиреозом, сахарным диабетом, гипертрофией предстательной железы, феохромоцитомой, порфирией следует применять Лазолван® Рино только по рекомендации врача в связи с наличием потенциального риска системной абсорбции препарата. Следует соблюдать осторожность при приеме ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов, вазопрессорных препаратов и антигипертензивных препаратов. Применение при беременности и в период грудного вскармливания <i>Беременность</i> Длительный опыт применения показывает, что Лазолван® Рино не оказывает негативного влияния на беременность. Препарат не следует применять во время первого триместра беременности. На более

Старая редакция	Новая редакция
более поздних сроках беременности и во время кормления грудью применение препарата допускается только после консультации врача.	поздних сроках беременности применение препарата Лазолван® Рино допускается только после консультации с врачом. <i>Грудное вскармливание</i> Безопасность применения препарата Лазолван® Рино в период грудного вскармливания не подтверждена. Применение препарата в период грудного вскармливания допускается только после консультации с врачом. <i>Фертильность</i> Исследования о влиянии препарата Лазолван® Рино на фертильность не проводились. На основе имеющихся доклинических данных отсутствуют упоминания о возможном влиянии трамазолина гидрохлорида на фертильность.
Способ применения и дозы Взрослым и детям старше 6 лет: По одному впрыскиванию в каждый носовой ход. До 4-х впрыскиваний в каждый носовой ход в день. Не следует применять препарат более 5 - 7 дней без назначения врача.	Способ применения и дозы Взрослым и детям с 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход. До 4-х впрыскиваний в каждый носовой ход в день. Не следует применять препарат более 5-7 дней без назначения врача.

Менеджер по регистрации



Тихонов Л.Л.