

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Неотон


порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г

Альфа Вассерманн С.п.А, Италия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 23 09 11 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: порошок белого цвета в виде гранул. Растворитель - прозрачная бесцветная жидкость Инструкция по проведению инфузии 1. Прозеинфицировать поверхности пробок двух флаконов (с препаратом в виде порошка и растворителем) и вставить переходник во флакон, содержащий растворитель. 2. Установить флакон с препаратом на переходник. 3. Перелить растворитель во флакон с препаратом. 4. Убрать пустой флакон с переходником. 5. Встряхнуть флакон до полного растворения препарата. 6. Наложить на флакон спираль из пластика. Вставить во флакон перфоратор с капельницей 7. Прозеинфицировать поверхности	Описание: порошок белого цвета в виде гранул. —

Старая редакция	Новая редакция
 пробок двух флаконов (с препаратом в виде порошка и растворителем) и вставить переходник во флакон, содержащий растворитель. 8. Установить флакон с препаратом на переходник. 9. Перелить растворитель во флакон с препаратом. 10. Убрать пустой флакон с переходником. 11. Встряхнуть флакон до полного растворения препарата. 12. Наложить на флакон спираль из пластика. Вставить во флакон перфоратор с капельницей. 13. Наложить регулирующий зажим и закрепить его. 14. Перевернуть и подвесить флакон. 15. Сжать капельницу до тех пор, пока она не заполнится наполовину раствором.	

Старая редакция	Новая редакция
16. Вставить иглу в наконечник. 17. Открыть зажим до тех пор, пока трубка и игла не заполнятся раствором, и раствор не начнет капать из иглы, после чего зажим закрыть. 18. Вставить иглу в вену, закрепив пластырем. 19. Закрепить трубку у запястья пластырем. 20. Открыть зажим и перелить раствор. 21. По окончании инфузии удалить иглу из вены, продезинфицировать место инъекции и наложить повязку. Форма выпуска <u>Порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г:</u> 1 г порошка во флаконе из нейтрального бесцветного стекла типа II с резиновой пробкой и алюминиевым колпачком под обкатку с отрывающейся крышечкой. <u>Растворитель:</u> 50 мл воды для инъекций во флаконе из нейтрального бесцветного стекла типа II с резиновой пробкой и алюминиевым колпачком под обкатку с отрывающейся крышечкой. По 1 или 4 флакона с порошком в комплекте с 1 флаконом растворителя, с 1 капельницей одноразовой или без нее и инструкцией по применению в картонной пачке.	Форма выпуска <u>Порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г:</u> 1 г порошка во флаконе из нейтрального бесцветного стекла типа II с резиновой пробкой и алюминиевым колпачком под обкатку с отрывающейся крышечкой. По 1 или 4 флакона вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Старая редакция	Новая редакция
Срок годности Неотон - 3 года. Растворитель – 5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.	Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Менеджер по регуляторным
вопросам


подпись

Близнюк О.И.

