

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Цефабол®

порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг

ООО «ПФК «Пребенд», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» **210520** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: состав на 1 флакон: действующее вещество: цефотаксим натрия (в пересчете на цефотаксим) 1000 мг	Состав: состав на 1 флакон: действующее вещество: цефотаксим натрия 1048 мг (в пересчете на цефотаксим) 1000 мг
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг. 1000 мг действующего вещества во флаконы стеклянные по 10 мл. Растворитель - «Вода для инъекций» в ампулах по 5 мл. 1. 1 флакон с препаратом и	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг. 1000 мг действующего вещества во флаконы стеклянные 1-го гидролитического класса по 10 мл, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатые колпачками

инструкцией по применению помещают в пачку картонную. 2. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем и инструкцию по применению упаковывают в пачку картонную. 3. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 4. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 5. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну	алюминиевыми или комбинированными (алюминиевыми с предохранительными пластмассовыми крышками) Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах стеклянных по 5 мл. 1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению помещают в пачку из картона. 2. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона. 3. 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона. 4. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой
--	--

контурную упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.	лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Не применять после истечения срока годности.	Условия хранения В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности.

Начальник отдела регистрации
лекарственных средств
ООО «ПФК «Пребенд»



С.Ю. Клепикова