

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВОР

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Медицинский антисептический раствор

Международное непатентованное наименование: этанол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения [спиртовой].

Состав на 100 г	40 %	70 %	90 %
------------------------	------	------	------

Активное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 95 %	36,0 г	67,5 г	92,7 г
------------------------------	--------	--------	--------

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная	64,0 г	32,5 г	7,3 г
----------------	--------	--------	-------

Описание: прозрачная бесцветная подвижная жидкость с характерным запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX08

Фармакологические свойства

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70% раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 90%, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

Фармакокинетика

При наружном применении всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек в системный кровоток. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

Показания к применению

Лечение начальных стадий гнойно-септических заболеваний (фурункулез, панариций, мастит); обработка рук (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля, в том числе у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и взрослых при операциях в области шеи и лица.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому компоненту препарата. Аллергическая реакция на предыдущее введение препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Данные о безопасности и эффективности применения препарата в периоды беременности и лактации не изучены. Применение препарата возможно в этот период только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка или плода.

Способ применения и дозы

Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70% раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40% раствор.

90% раствор должен быть разведен до необходимой концентрации и использован по показаниям.

Побочное действие

Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

Передозировка

Наркотическое вещество, вызывает характерное алкогольное возбуждение, в больших дозах угнетает функции центральной нервной системы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет сведений.

Особые указания

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в период лактации.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Противопоказано при управлении транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения [спиртовой].

По 50, 100 мл во флаконы или банки из бесцветного или оранжевого стекла укупоренные пробками полимерными или пробками полиэтиленовыми и крышками полимерными навинчиваемыми или колпачками алюминиевыми закатываемыми с прокладками.

Каждый флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Для стационаров и для производственных отделов аптек допускается укладка по 50 или 60 флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

По 5,0 , 10,0 , 15, 20, 21,5 , 25 и 30 л в полиэтиленовые канистры (для стационаров и для производственных отделов аптек).

Условия хранения

Хранить в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель/выпускающий контроль качества»

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

ОАО «Самарамедпром», Россия, 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99-Б. Тел./факс: (846) 373-81-07. (846) 373-81-08.

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443546, Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», литер Б, Б1, здание № 2.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Организация принимающая претензии от потребителей

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Генеральный директор
ОАО «Самарамедпром»



Найденов К.А.