

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эхинацея ВИЛАР®

**Регистрационный номер:** ЛП-000439**Торговое наименование:** Эхинацея ВИЛАР®**Международное непатентованное или группировочное наименование**

Эхинацеи пурпурной травы сок

**Лекарственная форма:** сок для приема внутрь**Состав**

Для получения препарата используют

Эхинацеи пурпурной травы свежей – 1710 г,

*Вспомогательное вещество:*

этанол (спирт этиловый) 95 % - 270 г

**Описание**

Прозрачная или опалесцирующая жидкость от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается образование осадка.

**Фармакотерапевтическая группа**

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** L03AX**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика.** Препарат обладает иммуномодулирующим (стимулирует антителообразование, существенно повышает пролиферативную активность лимфоцитов, стиму-

лирует функциональную активность фагоцитарных клеток) и противовоспалительным действием. Стимулирует костномозговое кроветворение, в результате чего увеличивается число лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы селезенки. Активирует преимущественно клеточный иммунитет, стимулирует фагоцитарную активность макрофагов и хемотаксис гранулоцитов, способствует высвобождению цитокинов, увеличивает продукцию интерлейкина<sub>1</sub> макрофагами, ускоряет трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки, усиливает антителообразование и Т-хелперную активность. Повышает неспецифическую резистентность организма (в т.ч. к возбудителям гриппа и герпеса). Обладает капилляропротекторным действием.

**Фармакокинетика.** Не описано.

### **Показания к применению**

Препарат применяют у взрослых *и детей старше 12 лет* в качестве иммуностимулирующего средства для усиления неспецифической иммунной реакции при часто повторяющихся острых воспалительных процессах или обострениях хронических заболеваний респираторных и мочевыводящих путей, а также при других заболеваниях, сопровождающихся снижением иммунного статуса организма.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных; прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (в том числе туберкулез, лейкоз, коллагеноз, рассеянный склероз, саркоидоз); состояния иммунодефицита (СПИД и ВИЧ-инфекция) и иммуносупрессии (в том числе цитостатическая противоопухолевая терапия; трансплантация органов или костного мозга в анамнезе); заболевания крови (агранулоцитоз, лейкемия); аллергические заболевания (крапивница, атопический дерматит, бронхиальная астма), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

### **С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, сахарный диабет, детский возраст старше 12 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопо-

казано (в связи с недостаточностью данных по применению у указанной категории пациентов).

### **Способ применения и дозы**

Препарат назначают взрослым *и детям старше 12 лет* внутрь после еды с небольшим количеством воды. В острый период заболевания (первые 3-5 дней) – по 30-40 капель на прием 3-4 раза в сутки; в дальнейшем – по 20-30 капель на прием до 3-4 раз в сутки в течение 2-х недель. Максимальная разовая доза – 60 капель (3 мл), максимальная суточная доза – 240 капель (12 мл).

Длительность лечения определяется состоянием больного и при необходимости может быть продлена до 1 –1,5 месяцев по согласованию с лечащим врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции: гиперемия, отек. Со стороны нервной системы: озноб. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

### **Передозировка**

Острое отравление и передозировка маловероятны.

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможно одновременное применение с антибиотиками и другими антимикробными средствами. *Не следует принимать препарат в течение 3-х суток после окончания курса лечения производными цефалоспоринов (цефамандол, цефотетан, цефменоксим, цефоперазон, моксалактам).*

Препарат несовместим с иммуносупрессорами.



Одновременное применение с цитокинами может усилить их эффект. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Эхинацея ВИЛАР® проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

В максимальной суточной дозе препарата (240 капель) содержится 1,8 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе (60 капель) содержится 0,45 г абсолютного этилового спирта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Сок для приема внутрь.

По 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл во флаконы из стекла марки ОС с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и закрытые крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

По 40 мл, 50 мл во флаконы стеклянные из коричневого стекла с винтовой горловиной закрытые крышками пластмассовыми навинчиваемыми с контролем первого вскрытия и уплотнительной прокладкой или крышками пластмассовыми с капельницей с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению и с пластмассовым мерным стаканчиком или пластмассовой мерной ложкой помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес: Россия, 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, дом 30, этаж 2, офис 206.

**Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей**

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес места производства лекарственного препарата (производственной площадки): Россия, 117216, город Москва, улица Грина, дом 7, строение 15, строение 27, строение 29.

Тел./факс: (495) 388-47-00.

Интернет-сайт: [www.vilar-plant.ru](http://www.vilar-plant.ru)

Генеральный директор

АО «Фармцентр ВИЛАР»



В.В. Степанов