МИНЗДРАВ РОССИИ
РЛ001153/01- 200614
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

Альфа-токоферола ацетат

раствор для приема внутрь масляный

50 мг/мл, 100 мг/мл, 300 мг/мл

ОАО «Марбиофарм», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «_____» 200614 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутрь. Профилактика гиповитаминоза Е. Взрослым и детям от 10 лет: мужчинам – 10 мг/сут (10 капель 5 % раствора, 5 капель 10 % раствора или 2 капли 30 % раствора), женщинам – 8 мг/сут (8 капель 5 % раствора, 4 капли 10 % раствора или 1 капля 30 % раствора), беременным – 10 мг/сут (10 капель 5 % раствора, 5 капель 10 % раствора или 2 капли 30 % раствора), кормящим матерям – 11-12 мг/сут (11-12 капель 5 % раствора, 5-6 капель 10 % раствора или 2 капли 30 % раствора); детям до 3 лет – 3-6 мг/сут (3-6 капель 5 % раствора, 2 -3 капли 10 % раствора	**Способ применения и дозы** Внутрь. Профилактика гиповитаминоза Е. Взрослым и детям от 10 лет: мужчинам – 10 мг/сут (10 капель раствора 50 мг/мл, 5 капель раствора 100 мг/мл или 2 капли раствора 300 мг/мл), женщинам – 8 мг/сут (8 капель раствора 50 мг/мл, 4 капли раствора 100 мг/мл или 1 капля раствора 300 мг/мл), беременным – 10 мг/сут (10 капель раствора 50 мг/мл, 5 капель раствора 100 мг/мл или 2 капли раствора 300 мг/мл), кормящим матерям – 11-12 мг/сут (11-12 капель раствора 50 мг/мл, 5-6 капель раствора 100 мг/мл или 2 капли раствора 300 мг/мл); детям до 3 лет-3-6 мг/сут

Старая редакция	Новая редакция
или 1 капля 30 % раствора), 3-10 лет – 7 мг/сут (7 капель 5 % раствора, 3 капли 10 % раствора или 1 капля 30 % раствора). Дозы и длительность лечения гиповитаминоза Е индивидуальны и зависят от тяжести состояния. Следует учитывать, что 1 капля 5-10-30 % раствора из глазной пипетки содержит около 1, 2 и 6,5 мг токоферола ацетата соответственно.	(3-6 капель раствора 50 мг/мл, 2-3 капли раствора 100 мг/мл или 1 капля раствора 300 мг/мл), 3-10 лет-7 мг/сут (7 капель раствора 50 мг/мл, 3 капли раствора 100 мг/мл или 1 капля раствора 300 мг/мл). Дозы и длительность лечения гиповитаминоза Е индивидуальны и зависят от тяжести состояния. Следует учитывать, что 1 капля раствора 50-100-300 мг/мл из глазной пипетки содержит около 1, 2 и 6,5 мг токоферола ацетата соответственно.
Форма выпуска Раствор для приема внутрь масляный 5 %, 10 %, 30 %. По 25 мл во флаконы-капельницы. По 50 мл во флаконы. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары	**Форма выпуска** Раствор для приема внутрь масляный 50 мг/мл, 100 мг/мл, 300 мг/мл. По 25 мл во флаконы-капельницы. По 50 мл во флаконы. Флакон-капельницу или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N001153/01- 200614
СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм»

Д.В. Болдов