ЛП-№(013502)-(РГ-RU) от 10.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1988
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Уголь активированный, 250 мг, таблетки.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: активированный уголь.

Каждая таблетка содержит 250 мг активированного угля.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки черного цвета, слегка шероховатые, с риской и фаской.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Уголь активированный показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 лет в качестве детоксицирующего средства:

– при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения;

– при комплексном лечении пищевой токсикоинфекции, сальмонеллеза, дизентерии;

– при отравлениях лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами;

– при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся диспепсией, метеоризмом;

– при пищевой и лекарственной аллергии;

– при гипербилирубинемии (вирусный гепатит и другие желтухи);

– при гиперазотемии (почечная недостаточность);

– для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуковым и рентгенологическим исследованием;

– с целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1988
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Взрослые

В среднем по 1–2 г (4–8 таблеток) 3–4 раза в сутки.

Максимальная разовая доза для взрослых – до 8 г (до 32 таблеток).

При остром отравлении лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем дают внутрь 20–30 г препарата.

При метеоризме назначают внутрь по 1–2 г (4–8 таблеток) 3–4 раза в сутки. Продолжительность лечения 3–7 дней.

Продолжительность лечения

При острых заболеваниях составляет 3–5 дней, при аллергии и хронических заболеваниях – до 14 дней. Повторный курс – через 2 недели по рекомендации врача.

Дети

Дети от 3 до 18 лет

Препарат назначается в среднем из расчета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки.

Максимальная разовая доза – до 0,2 г/кг массы тела.

Дети от 0 до 3 лет

Препарат Уголь активированный противопоказан у детей от 0 до 3 лет (см. раздел 4.3.).

Способ применения

Препарат принимают внутрь в таблетках или после предварительного измельчения, в виде водной взвеси, за 1–2 часа до или после еды и приема других лекарственных средств. Необходимое количество таблеток растворяют в 100 мл (1/2 стакана) охлажденной воды.

4.3. Противопоказания

– гиперчувствительность к активированному углю или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.;

– язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит);

– кровотечения из желудочно-кишечного тракта;

– одновременное назначение антитоксических лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (в том числе метионин и другие);

– атония кишечника;

– детский возраст до 3 лет.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 47 мг углеводов (0,004 ХЕ).

Особые указания

При лечении интоксикаций необходимо создать избыток активированного угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации активированного угля в среде способствует десорбции связанного вещества

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1988
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

в просвет кишечника и его всасыванию в кровь (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение активированного угля). Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения в высоких дозах, так как содержимое желудочно-кишечного тракта сорбируется активированным углем, и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечными гликозидами, индометацином, морфином и другими опиатами), необходимо применять активированный уголь в течение нескольких дней. При использовании препарата более 10–14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция.

Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы и пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Активированный уголь снижает всасывание и эффективность одновременно принимаемых лекарственных препаратов.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Прием препарата при беременности возможен, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Лактация

Прием препарата в период грудного вскармливания возможен, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Нежелательные реакции перечислены ниже в соответствии с классификацией по основным системам и органам и частоте встречаемости, которая была определена в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, но < 1/10); нечасто (≥ 1/1 000, но < 1/100); редко (≥ 1/10 000, но < 1/1 000); очень редко (< 1/10 000); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения метаболизма и питания

Частота неизвестна: при длительном применении (более 14 дней) возможно снижение всасывания кальция, витаминов, питательных веществ из желудочно-кишечного тракта.

Желудочно-кишечные нарушения

Частота неизвестна*:* диспепсия, запоры или диарея. Окрашивание кала в темный цвет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1988
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства; кишечные адсорбенты; препараты угля.

Код АТХ: A07BA01.

Механизм действия, фармакодинамические эффекты

Оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие. Относится к группе поливалентных физико-химических антидотов, обладает большой поверхностной активностью. Адсорбирует яды и токсины из желудочно-кишечного тракта до их всасывания, в том числе алкалоиды, гликозиды, барбитураты и другие снотворные и наркотические средства, соли тяжелых металлов, токсины бактериального, растительного, животного происхождения, производные фенола, синильной кислоты, сульфаниламиды, газы. Препарат адсорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ – билирубина, мочевины, холестерина, а также эндогенные метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Слабо адсорбирует кислоты и щелочи (в том числе соли железа, цианиды, метанол, этиленгликоль). Активен как сорбент при гемоперфузии. Не раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

Препарат не абсорбируется, не расщепляется.

Элиминация

Выделяется полностью через желудочно-кишечный тракт в течение 24 часов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1988
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Крахмал картофельный.

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

20–1 000 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона.

20–1 000 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона «Для стационаров».

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"

(ОАО "Фармстандарт-Лексредства")

Адрес: 305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Тел./факс: (4712) 34-03-13

www.pharmstd.ru

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1988
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Российская Федерация

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"

(ОАО "Фармстандарт-Лексредства")

Адрес: 305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Тел./факс: (4712) 34-03-13

www.pharmstd.ru

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Уголь активированный доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.