ЛП-№(005857)-(РГ-RU) от 18.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9520
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Йокс-Тева, спрей для местного применения

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: аллантоин + повидон-йод.
Каждый флакон содержит: 2,550 г повидон-йода, 0,030 г аллантоина.
Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: этанол, пропиленгликоль (см. раздел 4.4).
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Спрей для местного применения.

Прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость красно-коричневого цвета со специфическим запахом**.**

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Йокс-Тева показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 8 до 18 лет.

- Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в том числе: ангина, тонзиллит, тонзиллофарингит, глоссит, стоматит, афты;
- Для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;
- Для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;
- При стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Использовать препарат Йокс-Тева спрей рекомендуется 2–4 раза в день.
В случае необходимости препарат можно применять чаще – через каждые 4 часа.

Дети

Эффективность и безопасность препарата Йокс-Тева у детей в возрасте от 0 до 8 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Местно.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9520
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Инструкция для пациентов по использованию аппликаторов:
Дозированное распределение препарата из флакона осуществляется с помощью механического распылителя и аппликатора (см. рис. А1 или А2)



1. Если аппликатор помещен в полиэтиленовый пакет, извлеките его из пакета с помощью ножниц или аналогичного инструмента (см. рис. В2).



2. Проверьте целостность аппликатора. При повреждении аппликатора, его использование запрещено.
3. Снимите защитную крышку с механического распылителя.
4. Установите аппликатор на флакон (см. рис. В3).



5. Нажмите 2–3 раза, чтобы раствор прошел через распылитель, после чего начнется распыление препарата.
6. Поместите трубку аппликатора на 2–3 см в полость рта, задержите дыхание и нажмите на аппликатор 2 раза, при этом при первом нажатии распыляйте препарат в правую сторону, а при втором – в левую. При распылении удерживайте флакон в вертикальном положении.

Перед использованием промывайте аппликаторы горячей водой и всегда проверяйте их целостность. Запрещается пользоваться поврежденным аппликатором.

4.3. Противопоказания

- гиперчувствительность к аллантоину, повидон-йоду или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- беременность и период грудного вскармливания;
- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);
- сердечная недостаточность;
- герпетиформный дерматит Дюринга;
- одновременное применение радиоактивного йода.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Не применять внутрь.
Не следует вдыхать или проглатывать препарат.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9520
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Вспомогательные вещества

Данный лекарственный препарат содержит около 19 % спирта этилового (этанола).

Данный лекарственный препарат содержит пропиленгликоль.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Не рекомендуется одновременное применение препарата Йокс-Тева с другими антисептическими средствами, предназначенными для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащими перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Применение препарата Йокс-Тева при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Отсутствуют данные по изучению влияния препарата Йокс-Тева на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций.

Препарат Йокс-Тева спрей обычно переносится хорошо.
В отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительности к препарату и проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены препарата.
Длительное применение препарата может вызвать явление йодизма (в том числе: металлический вкус, повышенное слюнотечение, отеки глаз или гортани), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

До настоящего времени сведения о передозировке при местном применении препарата Йокс-Тева при лечении полости рта или глотки отсутствуют.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9520
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.
Код АТХ: R02AA15.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Лекарственный препарат Йокс-Тева является комбинированным препаратом для местного применения при заболеваниях полости рта и ЛОР-органов. При контакте с кожей или слизистыми оболочками выделяет йод; оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.
Препарат обладает широким спектром противомикробного действия, активен в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших.

5.2. Фармакокинетические свойства

Не изучалось.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Левоментол
Кислоты лимонной моногидрат
Натрия цитрата дигидрат
Этанол 96%
Пропиленгликоль
Вода очищенная

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от света. Не хранить в холодильнике. Не замораживать.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 30 мл во флаконы из ПЭТ (полиэтилентерефталата), снабженные механическим распылителем из полипропилена/полиэтилена/нержавеющей стали и крышкой из полипропилена, предохраняющей распылитель. Каждый флакон в комплекте с аппликатором из полипропилена и листком-вкладышем помещают в картонную пачку, на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.
Аппликатор может быть как в полиэтиленовом пакетике, так и без него.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9520
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Израиль
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.
124 Двора А-Невиа Ст., Тель-Авив 6944020

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей следует направлять по адресу:

Российская Федерация
ООО «Тева»
115054, Москва, ул. Валовая, 35
Телефон +7 (495) 644 22 34
Адрес электронной почты: info@teva.ru

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат Йокс-Тева относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Йокс-Тева доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).