ЛП-№(013944)-(РГ-RU) от 16.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Алвипсал, мазь для наружного применения.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: камфора, салициловая кислота, скипидар живичный, яд гадюки.
1 грамм мази содержит: камфора − 30,0 мг, салициловая кислота − 10,0 мг, скипидар живичный − 30,0 мг, яд гадюки – 0,05 МЕД (мышиных единиц действия).
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Мазь для наружного применения.
Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры и скипидара.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат назначается взрослым и детям старше 12 лет для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сопровождающихся болевым синдромом (в т. ч. при артралгии, невралгии, миалгии, ишиасе, радикулите).

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

В зависимости от величины области болезненного участка наносят маленькими порциями 5−10 г (1−2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости от интенсивности боли 1−2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома.
Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. При сохранении симптомов болезни после 14−дневного лечения проконсультируйтесь с врачом.

Дети

Дети в возрасте от 12 до 18 лет

Необходимость применения препарата у детей в возрасте от 12 до 18 лет определяется врачом индивидуально.
Режим дозирования для детей в возрасте от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Дети до 12 лет
Алвипсал противопоказан у детей в возрасте от 0 до 12 лет (см. раздел 4.3).

Способ применения

Наружно.

4.3. Противопоказания

− Гиперчувствительность к камфоре, салициловой кислоте, скипидару живичному, яду гадюки и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
− кожные заболевания (в том числе аллергического и бактериального генеза);
− активный туберкулез легких;
− лихорадочные состояния;
− общее истощение;
− тяжелая недостаточность мозгового и коронарного кровообращения;
− непереносимость салицилатов;
− склонность к ангиоспазмам;
− тяжелая печеночная и почечная недостаточность;
− детский возраст до 12 лет;
− беременность и период кормления грудью.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью

Детский возраст от 12 до 18 лет (необходимость применения препарата у детей определяется врачом индивидуально). Указания в анамнезе на бронхиальную астму, спровоцированную приемом ацетилсалициловой кислоты или иными нестероидными противовоспалительными препаратами.

Особые указания

При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу.
При случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение.
После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.
При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой.
Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.
Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Исследования взаимодействия не проводились.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность
Противопоказано применение препарата во время беременности.

Лактация
Противопоказано применение препарата во время грудного вскармливания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фертильность

Влияние мази Алвипсал на фертильность не изучалось, поэтому женщинам с детородным потенциалом следует использовать эффективные методы контрацепции в период лечения мазью Алвипсал.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат Алвипсал не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Частота возникновения нежелательных реакций определялась в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, но < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000, но < 1/100), редко (≥ 1/10 000, но < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Общие нарушения и реакции в месте введения
Частота неизвестна: при повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/.

4.9. Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.
Код АТХ: М02АХ10.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Болеутоляющая мазь с ядом гадюки.
Вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее действие.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Натрия хлорид
Эмульгатор № 1
Парафины твердые
Вазелин
Глицерол (глицерин)
Вода очищенная.

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 30 г в тубы алюминиевые с мембраной, бушонами из полиэтилена низкого давления. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
АО «Алтайвитамины»
659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69
Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948
Факс +7 (3854) 326-943
Эл. почта: office@altayvitamin.ru

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация
АО «Алтайвитамины»
659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69
Тел.: +7 (3854) 337-514
Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88
Адрес электронной почты: saraeva.n@altayvitamin.ru

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Алвипсал доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации)

(https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).