ЛП-№(013263)-(РГ-RU) от 16.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ингалипт ВИАЛАЙН, спрей для местного применения.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: Мяты перечной листьев масло + Сульфаниламид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта листьев масло.

Каждый флакон 25 мл содержит 0,625 г сульфаниламида натрия (месульфамида, стрептоцида растворимого), 0,472 г сульфатиазола натрия (в виде пентагидрата), 0,0125 г тимола, 0,0125 г эвкалипта листьев масла, 0,0125 г мяты перечной листьев масла.

Каждый флакон 30 мл содержит 0,750 г сульфаниламида натрия (месульфамида, стрептоцида растворимого), 0,566 г сульфатиазола натрия (в виде пентагидрата), 0,015 г тимола, 0,015 г эвкалипта листьев масла, 0,015 г мяты перечной листьев масла.

Каждый флакон 45 мл содержит 1,125 г сульфаниламида натрия (месульфамида, стрептоцида растворимого), 0,849 г сульфатиазола натрия (в виде пентагидрата), 0,0225 г тимола, 0,0225 г эвкалипта листьев масла, 0,0225 г мяты перечной листьев масла.

Каждый флакон 50 мл содержит 1,250 г сульфаниламида натрия (месульфамида, стрептоцида растворимого), 0,943 г сульфатиазола натрия (в виде пентагидрата), 0,025 г тимола, 0,025 г эвкалипта листьев масла, 0,025 г мяты перечной листьев масла.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: этанол, сахароза (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Спрей для местного применения.

Жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Ингалипт ВИАЛАЙН показан к применению у взрослых и детей старше 3 лет по показаниям: острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, гортани и носоглотки:

- тонзиллит;
- фарингит;
- ларингит;
- афтозный и язвенный стоматит.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Распыляют взвесь в полость рта в течение 1-2 секунд. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение производят 3-4 раза в сутки.

Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения.

Курс лечения не более 7 дней.

Дети

Режим дозирования для детей от 3 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Безопасность и эффективность у детей в возрасте от 0 до 3 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Применяется местно.

Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой, кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (при наличии язв или эрозий) с помощью тампона удаляют некротический налет.

Свободный конец распылителя ввести в рот и нажать на головку флакона в течение 1-2 сек.

Перед применением препарата убедитесь в надежной фиксации распылительной насадки, при необходимости зафиксируйте ее до упора (щелчка).
Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

4.3. Противопоказания

- гиперчувствительность к мяты перечной листьев маслу, сульфаниламиду, сульфатиазолу, тимолу, эвкалипта листьев маслу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- детский возраст (до 3 лет);
- беременность;
- период лактации;
- дефицит сахаразы/изомальтозы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Применение препарата Ингалипт ВИАЛАЙН у детей возможно только по рекомендации врача.

Флакон не вскрывать и не нагревать. Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Вспомогательные вещества

Этанол

Препарат Ингалипт ВИАЛАЙН содержит этанол 95 %/96 % (1,388 г/25 мл, 1,666 г/30 мл, 2,499 г/45 мл, 2,777 г/50 мл). Количество этанола в 25 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 37 мл пива или 13 мл вина. Количество этанола в 30 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 45 мл пива или 15 мл вина. Количество этанола в 45 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 67 мл пива или 23

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

мл вина. Количество этанола в 50 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 74 мл пива или 25 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

Сахароза

Препарат Ингалипт ВИАЛАЙН содержит сахарозу (1,25 г/25 мл, 1,5 г/30 мл, 2,25 г/45 мл, 2,5 г/50 мл), что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтозы не следует принимать данный лекарственный препарат.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Применение препарата при беременности противопоказано. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия.

Лактация

Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, т.к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Фертильность

Данные отсутствуют.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат Ингалипт ВИАЛАЙН не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

При применении препарата Ингалипт ВИАЛАЙН возможны аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

Симптомы

Тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение

Специфический антидот отсутствует, проводятся симптоматическая и поддерживающая терапия.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA20

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки).

Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении микромицетов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично абсорбируются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %.

Биотрансформация

В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками.

Элиминация

Период полувыведения стрептоцида составляет 10 часов, сульфатиазола натрия - 1-2 часа.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Этанол (спирт этиловый) 95 %/96 % (в пересчете на безводный)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Сахароза (сахар)

Глицерол (глицерин)

Полисорбат-80 (твин-80)

Вода очищенная

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить в оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре от 5 до 30 °С.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 25, 30, 45, 50 мл препарата во флаконы из полиэтилена или полиэтилентерефталата с полимерной крышкой навинчиваемой, или навинчиваемой с контролем первого вскрытия, или с навинчиваемой насадкой-распылителем с защитным колпачком или без колпачка.

Допускается вложение в каждую пачку отдельно лежащей насадки-распылителя с защитным колпачком или без колпачка в пакете полиэтиленовом или без пакета.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Россия
ООО «АТРАПАК»
115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж – 3, помещ./ком. IV/145

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:
Россия
ООО «Экспертно-юридический центр» (ООО «ЭЮЦ»)
Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 3, эт. 5, каб. 512
E-mail: pvchief@bloft.ru

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32397
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Ингалипт ВИАЛАЙН доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC