Internal
ЛП-№(013149)-(РГ-RU) от 13.01.2026
СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.12.2025 № 32136
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бронхикум С, пастилки.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: тимьяна обыкновенного травы экстракт.

Каждая пастилка содержит: 100 мг тимьяна обыкновенного травы экстракта жидкого*.

*Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий получен из Тимьяна обыкновенного травы (Thymus vulgaris L., сем. яснотковых — Lamiaceae).

Соотношение лекарственного растительного сырья к экстрагенту: 1:2–2,5.

Экстрагент: раствор аммиака 10 %, глицерин 85 %, спирт этиловый 90 % (об/об), вода; в соотношении 1:20:70:109.

Вещества, наличие которых следует учитывать в составе лекарственного препарата: сахароза (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Пастилки.

Круглые, слегка двояковыпуклые пастилки кремового цвета с небольшими вкраплениями.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Бронхикум С показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые принимают по 1–2 пастилки 3 раза в день.

Длительность применения препарата определяется степенью выраженности симптомов заболевания и его продолжительностью.

Дети

Режим дозирования для детей от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 1 пастилке 3 раза в день.

Безопасность применения препарата у детей в возрасте от 0 до 6 лет не установлены. Данные отсутствуют.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.12.2025 № 32136
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Способ применения

Внутрь, следует рассасывать в полости рта.

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к тимьяну обыкновенному травы экстракту или любому другому растению из семейства яснотковых (Lamiaceae), или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.;
- хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);
- тяжелые нарушения функции печени и почек.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Необходимо проинформировать пациента, что при отсутствии улучшения состояния в течение 5 дней, а также при возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты необходимо обратиться к врачу.

Вспомогательные вещества

Препарат Бронхикум С содержит сахарозу.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: одна пастилка соответствует 0,07 ХЕ (хлебных единиц), что необходимо учитывать лицам с сахарным диабетом, а также находящимся на гипокалорийной диете.

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Не рекомендуется прием препарата Бронхикум С одновременно с противокашлевыми препаратами, а также лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, поскольку это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Препарат Бронхикум С не рекомендуется при беременности.

Лактация

Препарат Бронхикум С не рекомендуется в период грудного вскармливания.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат Бронхикум С не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме в форме таблицы нежелательных реакций

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.12.2025 № 32136
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Ниже представлены нежелательные реакции, разделенные по системно-органным классам с указанием частоты их возникновения в соответствии со следующими градациями, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

- очень часто (≥ 1/10);

- часто (≥ 1/100, < 1/10);

- нечасто (≥ 1/1000, < 1/100);

- редко (≥ 1/10000, < 1/1000);

- очень редко (< 1/10000);

- частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

При соблюдении рекомендованного режима дозирования препарата Бронхикум С побочные эффекты незначительны.

Системно-органный класс	**Частота**	**Нежелательные реакции**
Нарушения со стороны иммунной системы	Частота неизвестна	Реакции гиперчувствительности
Нарушения со стороны сосудов	Частота неизвестна	Анафилактический шок
Желудочно-кишечные нарушения	Частота неизвестна	Диспепсия
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей	Частота неизвестна	Ангионевротический отек

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза — риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств — членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр.1

Тел.: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме препарата Бронхикум С.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.12.2025 № 32136
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA10

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Препарат обладает отхаркивающим и муколитическим действием.

5.2. Фармакокинетические свойства

Неприменимо.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Сахароза,

повидон,

левоментол,

цинеол,

акации камедь,

стеариновая кислота,

кремния диоксид коллоидный,

магния стеарат.

6.2. Несовместимость

Неприменимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 10 пастилок в блистере из поливинилхлорида/алюминиевой фольги. По 2 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Германия

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.12.2025 № 32136
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ/ A. Nattermann & Cie. GmbH

Brueningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, Germany

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

ООО «Опелла Хелскеа»

Адрес: Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 22

Тел.: +7 495 721-14-00

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Бронхикум С доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации): https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.