ЛП-№(009562)-(РГ-RU) от 16.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7011
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Каметон, спрей для местного применения

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: камфора + хлоробутанол + эвкалипта прутовидного листьев масло + [левоментол].

В 100 г препарата Каметон содержится 1,00 г хлоробутанола, 1,00 г камфоры, 1,00 г левоментола, 1,00 г эвкалипта прутовидного листьев масла.

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: пропиленгликоль (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Спрей для местного применения.

Маслянистая жидкость со специфическим запахом, после отстаивания прозрачная, бесцветная или почти бесцветная.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Каметон показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 5 до 18 лет в комбинированной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов (ринит, тонзиллит, фарингит, ларингит).

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Для лечения ринита за одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления в каждый носовой ход. Длительность нажатия на распылитель 1-2 сек. Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (фарингит, ларингит, тонзиллит) за одно применение у взрослых осуществляют по 2-4 распыления вправо и влево. Длительность нажатия на распылитель 1-2 сек. Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.

Дети

Режим дозирования препарата у детей в возрасте от 15 до 18 лет не отличается от режима дозирования у взрослых.

Для лечения ринита за одно применение у детей в возрасте от 5 до 12 лет – осуществляют по 1 распылению в каждый носовой ход, у детей от 12 до 15 лет – по 1-2

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7011
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

распыления. Длительность нажатия на распылитель 1-2 сек. Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (фарингит, ларингит, тонзиллит) за одно применение у детей в возрасте от 5 до 12 лет осуществляют по 1 распылению вправо и влево, у детей в возрасте от 12 до 15 лет – по 1-2 распыления. Длительность нажатия на распылитель 1-2 сек. Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.

Безопасность и эффективность препарата Каметон у детей в возрасте от 0 до 5 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Препарат применяется местно.

Перед применением с распылителя снимают защитный колпачок (при наличии). При применении баллон (флакон) следует держать вертикально, чтобы распылитель находился вверху; нельзя пользоваться баллоном (флаконом) в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель следует надеть защитный колпачок.

Для лечения ринита предварительно следует очистить нос от слизи, затем ввести туда распылитель на глубину 0,5 см. Распыление препарата Каметон при этом следует проводить на фазе «вдоха» путем нажатия на основание распылителя большим и указательным пальцем сверху вниз до упора.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (фарингит, ларингит, тонзиллит) распылительную насадку вводят в полость рта. Препарат следует применять после еды, предварительно прополоскав полость рта теплой кипяченой водой. Распыление препарата в этом случае проводят независимо от фазы «вдоха» или «выдоха».

4.3. Противопоказания

— Гиперчувствительность к камфоре, хлоробутанолу, эвкалипта прутовидного листьев маслу, левоментолу, или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Применение препарата Каметон у детей старше 5 лет возможно только по назначению врача.

При распылении в носовой полости не запрокидывать голову и не переворачивать баллон (флакон) вверх дном. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном (флаконом) нескольким пациентам во избежание распространения инфекции. Во время

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7011
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

распыления препарата следует избегать его попадания в глаза.

Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат содержит пропиленгликоль. Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Достаточный опыт по применению препарата при беременности и в период грудного вскармливания отсутствует. В связи с низкой системной абсорбцией компонентов, входящих в состав препарата, его местное применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не изучалось.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

При применении препарата возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи, которые проходят самостоятельно после отмены препарата. Возможны ощущения легкого жжения и покалывания.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1.

Телефон: +7 800 550 99 03

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7011
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

Симптомы

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке.

Лечение

Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов — активированного угля), симптоматическое лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA20

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Каметон - комбинированный препарат для местного применения, действие которого определяется входящими в его состав компонентами. Оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное местноанестезирующее действие. Хлорбутанол оказывает умеренное местноанестезирующее, противовоспалительное и антисептическое действие. Камфора оказывает раздражающее и отчасти антисептическое действие, усиливает кровоток в месте нанесения. Левоментол оказывает местноанестезирующее действие, сопровождающееся ощущением холода. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Обладает также слабым антисептическим свойством. Эвкалиптовое масло оказывает стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает также слабой местной противовоспалительной и антисептической активностью. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

5.2. Фармакокинетические свойства

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7011
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Пропиленгликоль

Вода очищенная

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 30 °С.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 30, 45 г во флаконы стеклянные или во флаконы темного стекла, или во флаконы-капельницы из оранжевого стекла, или во флаконы полимерные из полиэтилена высокого или низкого давления или из полиэтилентерефталата, укупоренные полимерной распылительной насадкой из полипропилена с колпачком из полистирола, или в баллоны алюминиевые аэрозольные с полимерной распылительной насадкой из полипропилена с колпачком из полистирола.

На флакон/флакон-капельницу/баллон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или этикетки из бумаги самоклеящейся.

Каждый флакон/флакон-капельницу/баллон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

ООО «Женел РД»

249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Тел.: +7 499 647 55 77.

Эл. почта: info@genelrd.ru

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.04.2026 № 7011
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

АО «Самарамедпром»

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Эл. почта: razvitie@samaramedprom.com.

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЛП-№(009562)-(РГ-RU)

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Каметон доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.