ЛП-№(005848)-(РГ-RU) от 24.09.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2024 № 11630
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Муравьиный спирт, раствор для наружного применения спиртовой 1,4 %,

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: муравьиная кислота.
В 100 г раствора содержится 1,4 г муравьиной кислоты.
Полный список вспомогательных веществ приведен в пункте 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для наружного применения спиртовой.
Прозрачная бесцветная жидкость своеобразного резкого запаха.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Показания к применению

Препарат Муравьиный спирт показан к применению в качестве отвлекающего в составе комплексной терапии у взрослых в возрасте 18 лет при:
- невралгии,
- артралгии,
- миалгии,
- неспецифических моно- или полиартритах.

4.2 Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые

Небольшое количество препарата наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают. Курс лечения продолжают в зависимости от лечебного эффекта, но не более 1 – 2 недель. При необходимости курс лечения можно повторить.

Дети

Отсутствуют данные по безопасности применения у данной группы пациентов.

Способ применения

Наружно.

4.3 Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу (муравьиной кислоте) или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема);
- беременность (см. раздел 4.6);
- период грудного вскармливания (см. раздел 4.4);
- детский возраст до 18 лет.

4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2024 № 11630
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Не допускается нанесение препарата на лицо и шею, половые органы, слизистые оболочки и раны. При попадании в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения препарата необходимо вымыть руки.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образовываться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых компонентов.

4.6 Фертильность, беременность и лактация.

Беременность

Препарат противопоказан к применению у беременных женщин (см. раздел 4.3).

Лактация

Препарат противопоказан к применению в период лактации (см. раздел 4.3).

4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не установлено влияния препарата Муравьиный спирт, раствор для наружного применения спиртовой на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

4.8 Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Возможны местные аллергические реакции (крапивница), покраснение кожи, зуда.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза-риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефоны: +7 8005509903
Факс: +7 (495) 698-15-73
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9 Передозировка

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2024 № 11630
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.
При случайном приеме внутрь возможны:
Симптомы
Головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушения функции сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.
Лечение
Следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.
Код АТХ: M02AX10
Препарат оказывает отвлекающее, местнораздражающее действие. Возбуждая чувствительные рецепторы кожи, вызывает расширение кровеносных сосудов, прямо и рефлекторно улучшает трофику тканей.

5.2 Фармакокинетические свойства

Нет данных

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Спирт этиловый (этанол) 70 %

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3 Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

6.5 Характер и содержание первичной упаковки

Раствор для наружного применения спиртовой 1,4%
По 40 мл, 50 мл, 100 мл раствора во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми пластмассовыми или пробками пластмассовые с крышками навинчиваемыми пластмассовыми или колпачками винтовыми с распылителем из полиэтилена.
1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2024 № 11630
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

От 9 до 300 флаконов без пачек «для стационаров» с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую коробку картонную.

6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ООО «ДАНСОН-РУ»,
Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49,
пом. 1, ком. 220.
Тел.: +7 (495) 580-30-60.

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения/производитель

Претензии потребителей направлять по адресу
Российская Федерация
Акционерное Общество «Ярославская фармацевтическая фабрика» (АО «ЯФФ»)
Адрес: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5
Тел.: +7 (4852) 44-38-56
Электронная почта: farm_info@yarff.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

Дата первой регистрации:

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

Общая характеристика лекарственного препарата Муравьиный спирт 1,4%, раствор для наружного применения спиртовой доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://eec.eaeunion.org/