ЛП-№(014134)-(РГ-RU) от 30.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1.НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Камфорная мазь,10 %, мазь для наружного применения

2.КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: камфора.
Каждые 100 г мази для наружного применения содержат 10 г камфоры.
Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекартсвенного препарата: ланолин безводный (см. раздел 4.4).
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Мазь для наружного применения.
Однородная мазь желтого или желто-коричневого цвета с запахом камфоры.

4.КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1.Показания к применению

Препарат Камфорная мазь показан к применению у взрослых пациентов для лечения следующих состояний:
Миалгия, миозит, артралгия, ишиас, профилактика образования пролежней.

4.2.Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования
Небольшое количество мази наносят на пораженные и болезненные участки и легкими движениями растирают 2-3 раза в день. Курс лечения 7-10 дней.
Дети
Безопасность и эффективность препарата Камфорная мазь у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.
Способ применения
Наружно.

4.3.Противопоказания

Гиперчувствительность к камфоре или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- Нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема);
- Беременность (см. раздел 4.6.);
- Период грудного вскармливания (см. раздел 4.6.);
- Детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

4.4.Особые указания и меры предосторожности при применении

Особые указания
Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.
Вспомогательные вещества
В состав препарата входит ланолин, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

4.5.Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Не выявлено.

4.6.Фертильность, беременность и лактация

Беременность
Применение препарата при беременности противопоказано.
Лактация
Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

4.7.Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за возможного возникновения побочного эффекта – головокружения.

4.8.Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций
Аллергические кожные реакции (крапивница); раздражение кожи; головная боль, головокружение.
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза-риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта:
pharm@roszdravnadzor.gov.ru
или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

4.9.Передозировка

Симптомы – возбуждение, тахикардия, судороги.
Лечение – симптоматическое.

5.ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1.Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.
Код АТХ: M02AX10
Механизм действия и фармакодинамические эффекты
При наружном применении оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

5.2.Фармакокинетические свойства

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизмененном виде легкими и с желчью. Проницаемость через гематоэнцефалический и плацентарный барьер – высокая. Секреция с грудным молоком – высокая.

6.ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1.Перечень вспомогательных веществ

Парафин твердый
Ланолин безводный
Вазелин

6.2.Несовместимость

Не применимо.

6.3.Срок годности (срок хранения)

4 года.

6.4.Особые меры предосторожности при хранении

Хранить защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

6.5.Характер и содержание упаковки

25 г, 50 г в банки темного стекла, укупоренные полиэтиленовыми крышками натягиваемыми с уплотняющим элементом или навинчиваемыми крышками.
20 г, 25 г, 30 г, 40 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушонами полимерными.
64 (или 49, или 36) банки по 25 г, 50 г с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

1 банку, тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку, изготовленную из картона.
1 банку, тубу помещают в пачку, изготовленную из картона, на которую нанесен полный текст инструкции по применению.

6.6.Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7.ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»
Юридический адрес: 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2
Тел./факс (4822) 44-41-19

7.1.Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»
Юридический адрес: 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2
Тел./факс (4822) 44-41-19
Электронная почта: tverfarm@yandex.ru

8.НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9.КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Камфорная мазь доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).