ЛП-№(014637)-(РГ-RU) от 27.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Йод, 5 %, раствор для наружного применения спиртовой

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: йод
Каждые 1 мл раствора содержат 50 мг йода.
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для наружного применения спиртовой.
Прозрачная бесцветная жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Йод показан к применению при воспалительных и инфекционных заболеваниях кожи, ссадинах, порезах, микротравмах, воспалительных инфильтратах, для обработки краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования
Наносят на пораженные или подлежащие обработке участки кожи. При обработке операционного поля кожу дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в растворе. Общее время обработки – 4-6 мин.
Способ применения
Наружно.

4.3. Противопоказания

Гиперчувствительность к йоду, вспомогательным веществам, перечисленным в разделе 6.1, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью
Детский возраст, беременность, период грудного вскармливания.

Особые указания
Следует избегать попадания в глаза.
Свет и температура выше 40 °С ускоряют распад активного йода. Препарат должен иметь темно-коричневую окраску. Обесцвечивание раствора свидетельствует о

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

разрушении комплекса с переходом активного йода в йодид-ион и снижении эффективности препарата.
Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия
Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (ртути амидохлоридом) - образуется взрывчатая смесь.

4.6. Фертильность, беременность и лактация
Беременность
Возможно применение.
Лактация
Возможно применение.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

4.8. Нежелательные реакции
Резюме нежелательных реакций
Раздражение кожи, аллергические реакции (кожный зуд), при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, повышенное слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь).

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза - риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств - членов Евразийского экономического союза.
Российская Федерация
109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка
Симптомы
При передозировке возможны явления йодизма, раздражения, ожоги.
Лечение
Симптоматическое; смыть избыток препарата чистой проточной водой.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5.1. Фармакодинамические свойства
Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; препараты йода.
Код АТХ: D08AG03
Фармакодинамические эффекты
Основным действующим веществом является молекулярный йод, обладающий антисептическим свойством. При нанесении на обширные поверхности кожи йод оказывает резорбтивное действие: активно влияет на обмен веществ, усиливает процессы диссимиляции, участвует в синтезе тироксина и трийодтиронина, обладает протеолитическим действием. Этиловый спирт замедляет выведение йода и уменьшает его раздражающее действие на ткани.
Оказывает бактерицидное действие, как на грамположительную, так и на грамотрицательную флору (активнее всего - на стрептококковую флору (*Streptococcus spp.*) и кишечную палочку (*Escherchia coli*), а также на патогенные грибки и дрожжи.
Более устойчивой флорой является стафилококк (*Staphylococcus spp*.), однако при длительном применении препарата 80% случаев отмечается подавление стафилококковой флоры. Синегнойная палочка (*Pseudomonas aeruginosa*) устойчива. Препарат малотоксичен.

5.2. Фармакокинетические свойства
Абсорбция
При контакте с кожей на 30 % превращается в йодиды, а остальная часть - в активный йод. Частично всасывается.
Распределение
Абсорбированная часть проникает в ткани и органы, селективно поглощается щитовидной железой.
Элиминация

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Выделяется почками (главным образом), кишечником, потовыми железами, с грудным молоком в период грудного вскармливания.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ:

Калия йодид
Этанол (спирт этиловый) 95 %
Вода очищенная

6.2. Несовместимость

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (ртути амидохлоридом) - образуется взрывчатая смесь.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 10, 25, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления или крышками, унифицированными укупорочно-навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления или полимерных материалов.
Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.
На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или самоклеящиеся этикетки.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
ООО «Научно-исследовательский институт Медицины и Стандартизации» (ООО «НИИМиС»)
141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, дом 1А, помещение III, офис 208.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения
Организация, принимающая претензии от потребителей
Российская Федерация
ООО «Научно-исследовательский институт Медицины и Стандартизации» (ООО «НИИМиС»)
141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, дом 1А, помещение III, офис 208.
Тел./факс +7 (495) 150-19-75

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Йод доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (http://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC)